

קומבינטוריקה למדעי המחשב - הרצאות

גדי אלכסנדרוביץ'

30 בינואר 2012

תוכן עניינים

2	מבוא	1
3	I קומבינטוריקה אנומרטובית	
3	עקרונות ספירה בסיסיים	2
3	עקרון החיבור ועקרון הכפל	2.1
4	תמורות (סידור בשורה)	2.2
5	חליפות (בחירה ללא חזרות ועם חשיבות לסדר)	2.3
6	צירופים (בחירה ללא חזרות וללא חשיבות לסדר)	2.4
6	סידור בשורה עם עצמים זהים	2.5
7	בחירה עם חזרות ועם חשיבות לסדר	2.6
7	בחירה עם חזרות וללא חשיבות לסדר	2.7
7	סיכום	2.8
9	עקרון שובך היונים	3
10	הבינום של ניוטון ומשולש פסקל	4
13	אינדוקציה ורקורסיה	5
13	אינדוקציה מתמטית	5.1
14	רקורסיה	5.2
15	כלל ההכלה וההפרדה	6
18	חלוקות	7
20	פונקציות יוצרות	8
21	נוסחאות נסיגה ופתרון	9
22	שיטת ההצבה הנשנית	9.1
22	שיטת המשוואה האופיינית	9.2
23	שימוש בפונקציות יוצרות	9.3
23	II מבוא לתורת הגרפים	
23	גרפים - הגדרה ודוגמאות	10
26	מסלולים אוילריאניים	11
28	גרפי דה-ברויין	12
29	עצים	13

29	הגדרה ואפיונים בסיסיים	13.1
30	משפט קיילי לספירת עצים	13.2
32	עצים מכוונים	13.3
33	עצים פורשים	13.4
33	הגדרה וקיום	13.4.1
34	ספירת עצים פורשים - משפט קירכהוף	13.4.2
37	למת האינסוף של קניג	13.5
37	תיאור הלמה	13.5.1
37	דוגמת שימוש - ריצופי Wang	13.5.2
38	מספרי קטלן	14
38	מסלולי שריג	14.1
39	סוגריים מאוזנים	14.2
39	עצים בינאריים	14.3

1 מבוא

קומבינטוריקה היא התחום במתמטיקה שעוסק באובייקטים סופיים, וכפי שניתן לנ-
חש מההגדרה העמומה הזו מדובר על תחום רחב ביותר שגבולותיו לא פשוטים להגדרה.
בקורס הזה נעסוק בשני תחומים עיקריים: בעיות ספירה (קומבינטוריקה אנומר-
טיבית), ומבוא לתורת הגרפים.

בעיות ספירה הן בעיות מהצורה הבאה: בהינתן הגדרה כלשהי של קבוצה סופית
של אובייקטים, כמה אובייקטים יש בקבוצה? לדוגמה, כמה ידיים אפשריות קיימות
במשחק ברידג'? כמה תוצאות אפשריות יש בלוטו? כמה הרכבי בתים אפשריים קיימים
בטורניר כדורסל? כמה מצבים אפשריים יש ללוח במשחק שחמט? וכדומה.

לרוב השאלות מנוסחות על קבוצת אובייקטים שמוגדרת באמצעות פרמטר n
כלשהו. למשל, בכמה דרכים אפשר להציג את המספר n כסכום של מספרים טבעי-
ים קטנים ממנו? בכמה דרכים ניתן לחלק מצולע משוכלל בעל n צלעות למשולשים?
בכמה דרכים יכול דוור מבובל/מזכירה מבולבלת (תלוי את מי רוצים להעליב) לחלק
 n מכתבים כך שאף אחד לא יגיע ליעדו?

שאלות כאלו צצות באופן טבעי במדעי המחשב, כשההקשר הנפוץ ביותר הוא ניתוח
סיבוכיות של אלגוריתמים, שם הקומבינטוריקה נחוצה הן בכדי להבין את מספר צעדי
הריצה שהאלגוריתם מבצע והן את גודל מרחב הקלטים שאיתו הוא מנסה להתמודד.
הקשר חשוב אחר הוא בעיות הסתברותיות ואלגוריתמים הסתברותיים; הבנה של
ההסתברות של מאורע מסויים דורשת לרוב ניתוח קומבינטורי של כמות התוצאות
האפשריות בכלל (למשל, ידיעת ההסתברות לאזיח בלוטו דורשת הבנה של כמות
התוצאות האפשריות בלוטו).

הפתרון הטוב ביותר לבעיה קומבינטורית הוא כמובן מספר מדויק, ובמקרה של
בעיה שתלויה בפרמטר n , נוסחה פשוטה שתלויה ב- n - למשל, מספר תתי-קבוצות
של קבוצה מגודל n הוא בדיוק 2^n . בקורס זה תיווצר "אשליה" שרבות הבעיות שניתן
למצוא להן נוסחה מדויקת שכזו, שכן רבות מהבעיות שנציג בקורס אכן יהיו כאלו;
בעולם האמיתי נוסחה סגורה שכזו היא נדירה בהרבה, ולעתים קרובות גם איננה
מועילה במיוחד. עיקר העניין הוא בסדר הגודל של הפתרון; קירוב אסימפטוטי כלשהו
אליו, מכיוון שאנו עוסקים במבוא בלבד, בקורס זה לא ניגע בכלל בעניינים אלו, שהם
לב לבם של הקומבינטוריקה האנומרטטיבית.

עבור בעיות שלא קל למצוא להן פתרון סגור פשוט באמצעות שיקולים אלמנטריים נלמד מקצת מהכלים החזקים יותר שמאפשרים התמודדות עם הבעיה - עקרון ההכלה וההפרדה, נוסחאות נסיגה ופתרון ופונקציות יוצרות. כמו כן נדבר על הבינום של ניוטון, משולש פסקל ועקרון שובך היונים, שהם מושגים מתמטיים בסיסיים הקשורים לספירה שהדרך הטובה ביותר להבינם הוא במסגרת הקומבינטוריקה. תורת הגרפים עוסקת באובייקט שהוא אולי המרכזי במדעי המחשב - אוסף של איברים ("צמתים") שחלקם מחוברים אלו לאלו (על ידי "קשתות"). גרפים ממדלים אינספור בעיות ומושגים במדעי המחשב - החל במעגלים בוליאניים

חלק I

קומבינטוריקה אנומרטיבית

2 עקרונות ספירה בסיסיים

בפרק זה נציג את "כלי העבודה" הבסיסיים של קומבינטוריקה אנומרטיבית - העקרונות המנחים שמשמשים אותנו בפתרון כמעט כל בעיה קומבינטורית, ופתרונות של כמה בעיות יסודיות שמשמשים בהן לרוב בתור אבן הבניין לפתרון בעיות מורכבות יותר.

בלשון מתמטית פורמלית, בעיית ספירה קומבינטורית היא זו: נתונה קבוצה סופית A ואנו מעוניינים למצוא מהו $|A|$ - מספר האיברים ב- A .

2.1 עקרון החיבור ועקרון הכפל

במשחק לוח הזוי כלשהו השחקן יכול בתורו או להטיל קוביה רגילה או להטיל מטבע. כמה תוצאות אפשריות ישנן?

במקרה זה ישנן 6 תוצאות אפשריות להטלת הקוביה, ו-2 תוצאות אפשריות להטלת המטבע, ולכן בסך הכל יש $6 + 2 = 8$ תוצאות אפשריות.

כמה מהלכי פתיחה חוקיים יש ללבן במשחק השחמט?

במקרה זה כל רגלי של הלבן יכול לנוע צעד או שני צעדים קדימה, וכל אחד מהפרשים ים יכול לנוע אחד משני צעדים אפשריים קדימה. בסך הכל יש $8 + 8 + 2 + 2 = 20$ מהלכי פתיחה אפשריים.

מה העקרון המשותף לדוגמאות שלעיל? בכל המקרים ביצענו בחירה מתוך כמה "סוגי" אפשרויות שונים, כשהבחירה היא מסוג או - או שמזיגים רגלי צעד אחד (8 אפשרויות) או שמזיגים רגלי שני צעדים (8 אפשרויות), או שמזיגים את הפרש הימני (2 אפשרויות) או שמזיגים את הפרש השמאלי (2 אפשרויות). זהו מקרה פרטי של עקרון החיבור:

טענה 2.1 (עקרון החיבור) אם קיימות n_1 אפשרויות לבצע בחירה מסוג אחד ו- n_2 אפשרויות לבצע בחירה מסוג שני, אז קיימות $n_1 + n_2$ אפשרויות לבצע בחירה מסוג אחד או מהסוג השני.

בניסוח מתמטי פורמלי, אם A, B הן שתי קבוצות זרות אז $|A \cup B| = |A| + |B|$

סטודנט צריך לקחת בסמסטר קורס ספורט אחד מבין שחמט וברידיג' (מעשה שהיה באמת בטכניון), וקורס מדעי אחד מבין פיזיקה וכימיה. כמה אפשרויות בחירה יש לו?

לסטודנט יש 2 בחירות לקורס ספורט ו-2 בחירות לקורס מדעי וכל זוג אפשרי של בחירות הוא חוקי. ישנן אם כן 4 אפשרויות:

1. שחמט, פיזיקה

(א) שחמט, כימיה

(ב) ברידג', פיזיקה

(ג) ברידג', כימיה

כלומר, לכל אחת מהאפשרויות לבחירה הראשונה, בן זוגה יכול להיות כל אחת מהאפשרויות בבחירה השנייה.

במונופול בכל סיבוב מוטלות שתי קוביות. כמה תוצאות אפשריות ישנן? לכל אחת מהקוביות יש 6 תוצאות אפשריות, ואנחנו מתעניינים בכל הזוגות של תוצאה של קוביה אחת ותוצאה של הקוביה השנייה, כך שבסך הכל יש לנו 36 זוגות אפשריים מהצורה (i, j) כאשר $1 \leq i, j \leq 6$.

מה העקרון המשותף לדוגמאות שלעיל? בכל המקרים ביצענו בחירה דו שלבית. הבחירה היא מסוג "וגם" - יש לבחור גם קורס ספורט וגם קורס מדעי. זהו מקרה פרטי של עקרון הכפל:

טענה 2.2 (עקרון הכפל) אם קיימות n_1 אפשרויות לבצע בחירה מסוג אחד ו- n_2 אפשרויות לבצע בחירה מסוג שני, אז קיימות $n_1 \cdot n_2$ אפשרויות לבצע בחירה מסוג אחד וגם בחירה מהסוג השני.

בניסוח מתמטי פורמלי, אם A, B הן שתי קבוצות (לא בהכרח זרות) אז $|A \times B| = |A| \cdot |B|$ הוא אוסף כל הזוגות של איבר מ- A ואיבר מ- B .

2.2 תמורות (סידור בשורה)

בכמה דרכים ניתן לסדר n ילדים בשורה?

זהו שימוש ישיר בעקרון הכפל. נפתור את הבעיה בשתי גישות שונות על מנת להמחיש שניתן להגיע לתוצאה מכמה נקודות מבט שונות (מה שרק מחזק את האמונה שלנו בנכונות התוצאה, כמובן).

- בגישה הראשונה נניח שאנו עוברים אחד אחד על הילדים ולכל ילד בוחרים לו מקום בשורה מבין אלו שעדיין פנויים (אנו מניחים מראש שהשורה מחולקת ל- n "תאים"). עבור הילד הראשון יש n בחירות, עבור השני יש רק $n - 1$ בחירות (כי מקום אחד כבר תפוס), עבור השלישי $n - 2$ בחירות וכן הלאה עד לילד האחרון שיש לו בדיוק בחירה אחת.

- בגישה השנייה נניח שאנו עוברים אחד אחד על המקומות בשורה ולכל אחד מהם בוחרים איזה ילד יהיה בו. גם כאן יש n בחירות לילד הראשון, $n - 1$ בחירות לילד השני (כי כבר סידרנו את אחד הילדים בשורה ולא ניתן לבחור בו שוב), וכן הלאה עד למקום האחרון שבו יכול להיות רק ילד אחד בלבד - זה שנשאר.

- בגישה השלישית נבנה את השורה ילד אחרי ילד מבלי להניח שהשורה מחולקת מראש לתאים, כשבכל פעם אנו שואלים את עצמנו להיכן אפשר להכניס את הילד הבא בתור. יש בחירה 1 לילד הראשון (כי כרגע השורה ריקה), 2 בחירות לילד השני (משמאל או מימין לילד הקיים), 3 בחירות עבור השלישי (משמאל לזוג הקיים, מימין לו או באמצע) וכן הלאה עד n בחירות לילד האחרון.

בכל המקרים קיבלנו את אותה התוצאה: $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$. בגלל השימושיות הרבה של הפעולה הזו במתמטיקה יש לה שם וסימון מיוחד - $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$ (קרי "n עצרת"). את $n!$ ניתן להגדיר גם באופן רקורסיבי שהוא מועיל לעתים:

$$0! = 1 \bullet$$

$$n! = n \cdot (n-1)! \text{ לכל } n \geq 1 \bullet$$

הערה 2.3 אין ל- $n!$ נוסחה פשוטה, אך יש לה קירוב מצויין, שהופך לשימושי מאוד כאשר עוסקים בקומבינטוריקה בחיפוש אחרי סדרי גודל בלבד: נוסחת סטירלינג, $n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$ (המשמעות הפורמלית היא שמנת שני צדדי המשוואה שואפת ל-1 כאשר n שואף לאינסוף). בקורס הזה לא נזדקק לנוסחת סטירלינג אך מומלץ לכל סטודנט להיות מודע לקיומה.

בכמה דרכים ניתן לסדר n ילדים בשורה אם ידוע שאליס ובוב חברים ורוצים להיות זה ליד זה?
כמקודם, נפתור במספר דרכים:

• נסדר את כל הילדים בשורה למעט אליס - $(n-1)!$ אפשרויות. כעת אליס יכולה להיות משמאל או מימין לבוב, ולכן סך הכל יש $2(n-1)!$ אפשרויות.

– "נדביק" יחד את אליס ובוב ונחשוב עליהם בתור ילד אחד (בוליס?). נסדר את $n-1$ הילדים (הילדים הרגילים ו"בוליס") בשורה ונקבל $(n-1)!$ אפשרויות. כעת, יש שתי אפשרויות לסידור הפנימי של "בוליס" (בוב מימין ואליס משמאל או בוב משמאל ואליס מימין) ולכן מעקרון הכפל נקבל $2(n-1)!$ אפשרויות.

אליס ובוב רבו. בכמה דרכים ניתן לסדר את n הילדים בשורה כך שאליס אינה ליד בוב?

• נסדר את כל הילדים בשורה למעט אליס - $(n-1)!$ אפשרויות. כעת אליס יכולה להיות בכל מקום למעט ימין או שמאל בוב, ולכן יש לה $n-2$ אפשרויות ומעקרון הכפל נקבל $(n-2)(n-1)!$.

– "עקרון החיסור": מספר אפשרויות הסידור בשורה של הילדים הוא $n!$, וראינו כבר כי בדיוק ב- $2(n-1)!$ מתוך האפשרויות הללו אליס היא ליד בוב. אז מה שנותר הוא

$$n! - 2(n-1)! = n(n-1)! - 2(n-1)! = (n-2)(n-1)!$$

אפשרויות.

2.3 חליפות (בחירה ללא חזרות ועם חשיבות לסדר)

יש ספסל עם 5 מקומות ו-20 ילדים. בכמה דרכים אפשר לסדר 5 מבין הילדים על הספסל?

- יש 20 בחירות של ילד למקום הראשון, 19 למקום השני וכן הלאה עד 16 למקום החמישי: $20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16$. על פי ההגדרה קל לראות שזה שווה ל- $\frac{20!}{15!}$.

– "עקרון החילוק" - נסדר את 20 הילדים בשורה - $20!$ אפשרויות. כעת ניקח את חמשת הראשונים ונשים על הספסל בסדר שלהם בשורה. בצורה זו יש לנו ספירות כפולות - כל סידור של ילדים על הספסל מתאים בדיוק ל- $15!$ מבין אפשרויות הסידור של הילדים בשורה - מספר הסידורים הפנימיים של 15 הילדים שאינם במקומות הראשונים. גישה זו קשה יותר להבנה מהגישה הראשונה אך חזקה בהרבה ומסבירה ישירות את התוצאה $\frac{20!}{15!}$.

הדוגמה שלעיל היא מקרה פרטי של הבעיה הבאה: בכמה דרכים ניתן לבחור k מתוך n אובייקטים ($k \leq n$) כאשר יש חשיבות לסדר שבו נבחרים האובייקטים?

כפי שראינו בדוגמה, הפתרון הכללי הוא $\frac{n!}{(n-k)!} = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)$ לצורך פשוטות משתמשים לעתים בסימון $P(n, k) = P_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$. אזהרה! יש עוד שלל צורות כתיבה מוזרות לסימון (דוגמת P_k^n או ${}_n P_k$) והדרך הבטוחה ביותר להימנע מבלבול היא פשוט לא להשתמש בו כלל.

2.4 צירופים (בחירה ללא חזרות וללא חשיבות לסדר)

בכמה דרכים ניתן לבחור k מתוך n אובייקטים כאשר אין חשיבות לסדר שבו נבחרים האובייקטים?

נסמן ב- C_n^k את המספר הזה. אז $C_n^k \cdot k! = P_n^k$ על פי עיקרון הכפל - קודם בוחרים k אובייקטים בלי חשיבות לסדר (C_n^k אפשרויות) ואז בוחרים אחד מ- $k!$ הסידורים האפשריים שלהם. מספר זה שווה למספר האפשרויות לבחור את האובייקטים כאשר מלכתחילה מתחשבים בסדר.

$$C_n^k = \frac{P_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

סימון אחר ומקובל בהרבה ל- C_n^k הוא זה: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. בסימון זה נשתמש מכאן ואילך.

2.5 סידור בשורה עם עצמים זהים

נתונים k_1 כדורים מצבע אחד, k_2 כדורים מצבע אחר וכן הלאה עד k_t כדורים מצבע t . נסמן $n = \sum_{i=1}^t k_i$. בכמה דרכים ניתן לסדר את הכדורים בשורה? דרך הפתרון היא לחשוב על כל הכדורים כשוניים אלו מאלו, לסדר אותם בשורה ($n!$ אפשרויות) ואז לכל צבע לחלק במספר הסידורים הפנימיים של אותו הצבע ($k_i!$ לכל i).

$$\text{מקבלים: } \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_t!}$$

צירופים הם מקרה פרטי כאשר $t = 2$ (אפשר לחשוב על כך כאילו בוחרים את המקומות לכדורים מהצבע הראשון, ואז המקומות עבור הצבע השני נקבעים מאליהם). אפשר לחשוב על $\frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_t!}$ בתור הכללה של צירופים: מספר האפשרויות לבחור k_1 מתוך n אובייקטים עבור קבוצה אחת, k_2 עבור קבוצה שניה וכן הלאה, כאשר אין חשיבות לסדר הבחירה.

$$\binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_t} = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_t!}$$

2.6 בחירה עם חזרות ועם חשיבות לסדר

בכמה דרכים ניתן לבנות מספר בן 5 ספרות בעזרת הספרות 1,2,3 בלבד?
יש לנו 3 אפשרויות בחירה לספרה הראשונה, 3 לספרה השנייה וכן הלאה. על פי עקרון הכפל נקבל $3^5 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$.
בדוגמה זו יש חשיבות לסדר הבחירה (13 איננו אותו מספר כמו 31) ויש חזרות - ניתן לבחור את אותה ספרה יותר מפעם אחת. המקרה הכללי מטופל באותו האופן:

טענה 2.4 מספר האפשרויות לבחור k מתוך n אובייקטים עם חזרות ועם חשיבות לסדר הוא n^k .
שימו לב כי כאן לא נדרש ש- $k \leq n$.

2.7 בחירה עם חזרות וללא חשיבות לסדר

כמה סדרות מונוטוניות לא יורדות באורך k קיימות מעל $1, 2, \dots, n$?
דוגמה לסדרה מונוטונית לא יורדת שכזו עבור $k = 6, n = 7$: (1, 3, 3, 3, 5, 7).
הבחנה: a_1, a_2, \dots, a_k היא סדרה מונוטונית לא יורדת מעל $1, 2, \dots, n$ אם ורק אם $a_1 + 0, a_2 + 1, \dots, a_k + (k - 1)$ היא סדרה מונוטונית עולה מעל $1, 2, \dots, n + (k - 1)$.
סדרות מונוטוניות עולות קל בהרבה לספור מבחינה רעיונית: בוחרים את k המספר-ים שישתתפו בסדרה ללא חשיבות לסדר, והסדרה כבר נקבעת מעצמה על פיהם.
לכן קיבלנו $\binom{n+k-1}{k}$.

זוהי דוגמה לבחירה עם חזרות (ניתן לבחור את אותו מספר כמה פעמים) וללא חשיבות לסדר (הסידור של המספרים בסדרה נקבע באופן יחיד).
מה מספר הדרכים להכנסת k כדורים זהים ל- n תאים שונים?
נוח לחשוב על התהליך באופן הפוך - k הכדורים מסודרים בשורה, ויש לבנות סביבם "מחיצות" כדי ליצור n תאים, כך שצריך $n - 1$ מחיצות.
ניתן לתאר באופן סכמטי באמצעות סדרה: 010011 כאשר 0 מייצג כדור ו-1 מייצג מחיצה. כאן יש שלושה תאים: בשמאלי יש כדור אחד, באמצעי שניים ובימני אפס.
אם כן, המספר הוא מספר הסדרות הבינאריות עם k אפסים ו- $n - 1$ אחדים. כל שנדרש הוא לבחור את מיקום האפסים כך שיש $\binom{n+k-1}{k}$ אפשרויות.
גם כאן הייתה בחירה עם חזרות (ניתן להכניס כדור לאותו תא פעמים רבות) וללא חשיבות לסדר (הכדורים זהים ולכן לא חשוב אם קודם מכניסים אחד לתא 1 ואז לתא 2 או הפוך - בסוף בשני התאים יהיה כדור בודד).

כמה פתרונות במספרים שלמים אי שליליים יש למשוואה $x_1 + x_2 + \dots + x_n = k$?
קל לראות שיש התאמה חח"ע ועל בין הבעיה הזו לבעיה הקודמת: המשתנים הם התאים, וערכו של כל משתנה הוא מספר הכדורים שהוכנסו אליו ולכן גם כאן הפתרון הוא $\binom{n+k-1}{k}$.

2.8 סיכום

- סידור n עצמים בשורה: $n!$
- סידור n עצמים בשורה כאשר הם מחולקים למחלקות זהות בגדלים k_1, \dots, k_t :
$$\frac{n!}{k_1! \dots k_t!}$$
- בחירות של k מתוך n :

סדר\חזרות	חשוב	לא חשוב
בלי	$P_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$	$C_n^k = \binom{n}{k}$
עם	$PP_n^k = n^k$	$CC_n^k = \binom{n+k-1}{k}$

עוד כמה תרגילים ופתרונם:

כמה "דיים" שונות של 5 קלפים בפקר ניתן לקבל?

זוהי בחירה של 5 קלפים מתוך 52 ללא חשיבות לסדר וללא חזרה ולכן $\binom{52}{5} = \frac{52!}{5!47!}$
 כמה אפשרויות למילוי טופס טוטו קיימות?

כאן ישנם 16 טורים שבכל אחד מסמנים 1 או 2 או X, כלומר בחירה עם חשיבות לסדר ועם חזרות של 16 מ-3, ולכן $3^{16} = 43,046,721$.

מה ההסתברות לזכות בלוטו הישראלי, שבו ממלאים 6 מ-37 מספרים ועוד 1 מ-7 "מספרים חזקים"?

כאן יש לנו שתי בחירות ללא חשיבות לסדר וללא חזרות ואנו מפעילים עליהן את עקרון הכפל ומקבלים $\binom{37}{6} = 16,273,488$ ולכן סיכויי הזכייה הם $1 : 16,273,488$.
 "וקטור בינארי" מאורך n הוא פשוט סדרה של n ערכים שהם 0 או 1.

ברור כי יש 2^n וקטורים בינאריים מאורך n (בחירה עם חזרות מתוך $\{0, 1\}$ ועם חשיבות לסדר כי וקטור הוא סדרה).

כמה וקטורים בינאריים קיימים שבהם יש לפחות מופע אחד של 1:

פתרון נפוץ ושגוי לשאלות מסוג זה הוא כדלהלן: נבחר אחד מ- n המקומות בתור המקום שבו יופיע ה-1 שאנחנו "מחוייבים" לו, ואז נבחר בחופשיות את הכניסות עבור שאר המקומות, ונקבל $n \cdot 2^{n-1}$ אפשרויות.

דרך לזהות את השגיאה היא לבדוק את הפתרון עבור ערכים קטנים: עבור $n = 2$ נקבל מהנוסחה כי ישנם $2 \cdot 2^1 = 4$ וקטורים בינאריים מתאימים, אבל קל לראות כי קיימים רק שלושה: 10, 01, 11. ביצענו טפידה כפולה.

הספירה הכפולה ספרה את הוקטור 11 פעמיים: פעם אחת נבחר 1 להיות במקום הראשון בשלב הראשון, ובשלב השני נבחר שבמקום השני יופיע גם כן אחד; בפעם האחרת נבחר 1 להיות דווקא במקום השני, ואילו ה-1 שבמקום הראשון נבחר אחר כך. הדבר אינו נוגד את עקרון הכפל שכן עקרון הכפל דורש שכל זוג בחירות יוביל לתוצאה שונה, ואילו כאן יש שני זוגי בחירות שונים אפשריים שמובילים לאותו האובייקט בדיוק.

הדרך הנכונה לפתור את התרגיל הזה היא באמצעות עקרון החיסור: ישנו רק וקטור בודד מאורך n שלא מכיל 1-ים (הוקטור שכולו אפסים) ולכן יש $2^n - 1$ וקטורים מאורך n שמכילים 1 לפחות פעם אחת.

כמה פתרונות בשלמים יש למשוואה $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 30$ אם דורשים כי $x_i \geq 1$?

כאן אנחנו רוצים להשתמש בתוצאה המוכרת של בחירות בלי חשיבות לסדר ועם חזרות, אבל שם התוצאה תקפה עבור $x_i \geq 0$.

הרעיון האינטואיטיבי - מחלקים 30 כדורים לחמישה תאים תחת האילוץ שאין תא ריק, אז קודם כל נשים כדור אחד בכל תא ואז נחלק את 25 הכדורים הנותרים באופן חופשי.

בפועל: נשתמש בתעלול ונגדיר משתנים חדשים y_i כך ש- $x_i = y_i + 1$. נציב במשוואה המקורית ונקבל:

$$(y_1 + 1) + (y_2 + 1) + (y_3 + 1) + (y_4 + 1) + (y_5 + 1) = 30$$

ובניסוח שקול:

$$y_i \geq 0, y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 25$$

ולכן הפתרון הוא $\binom{29}{25} = \binom{5+25-1}{25}$.

יהא \mathbb{F}_q שדה סופי עם q איברים. כמה מטריצות הפיכות 2×2 מעל \mathbb{F}_q קיימות? עבור מטריצות 2×2 , מטריצה היא הפיכה אם ורק אם אף שורה איננה כפל בסקלר של השורה השניה. עבור השורה הראשונה כל שורה אפשרית פרט לשורה שכולה אפסים היא לגיטימית, ומכיוון שיש q ערכים אפשריים לכל כניסה, מעקרון הכפל יש q^2 שורות אפשריות, ולאחר חיסור שורת האפסים נקבל $q^2 - 1$ אפשרויות. כעת, בהינתן השורה הראשונה כל אחת מ- q^2 השורות אפשריות עבור השורה השניה פרט לאלו שהן כפל בסקלר של השורה הראשונה. קיימים q סקלרים ואותה שורה לא מתקבלת על ידי כפל בשני סקלרים שונים, כך שיש $q^2 - q$ שורות לגיטימיות בסך הכל.

מעקרון הכפל נקבל שיש $(q^2 - 1)(q^2 - q)$ מטריצות הפיכות מהסוג הנדרש.

3 עקרון שובך היונים

עקרון שובך היונים הוא אבחנה מתמטית פשוטה ביותר, ועם זאת הוא כלי שימושי מאוד בפתרון בעיות קיום רבות, לעתים בצורות מפתיעות למדי.

טענה 3.1 (עקרון שובך היונים): אם ב- n שובכים ישנן $n+1$ יונים, אז קיים שובך שבו יש לפחות שתי יונים.

ניסוח כללי יותר: אם ב- n שובכים ישנן m יונים, אז קיים שובך שבו יש לפחות $\lceil \frac{m}{n} \rceil$ יונים.

הוכחת הטענה היא בשלילה - אם בכל שובך יש לכל היותר יונה אחת, אז יש בכולם יחד לא יותר מ- n יונים. באופן דומה מוכחת הטענה הכללית.

נפתח בדוגמאות פשוטות:

קיימים בעולם שני אנשים לא קרחים בעלי בדיוק אותה כמות שערות על הראש. זה נובע מכך שמספר השערות על הראש נמדד במאות אלפים, בעוד שבעולם ישנם מיליארדי אנשים - האנשים הם היונים, מספרי השערות האפשריים הם השובכים. בחדר עם 366 אנשים קיימים שני אנשים בעלי אותו יום הולדת (אם מתעלמים מחריגים כמו ה-29 בפברואר)¹.

בקורס עם למעלה מ-100 סטודנטים מובטח שיהיו שני סטודנטים שיקבלו את אותו הציון (אם כולם ניגשים לבחינה...)

לא קיים כיווץ משמר מידע שמקטין כל קובץ: לכל n יש 2^n קבצים מאורך n ביטים ו- $2^n - 1 = 1 + 2 + 4 + \dots + 2^{n-1}$ קבצים מאורך לכל היותר $n-1$ ביטים ולכן מעקרון שובך היונים כל כיווץ שמקטין כל קובץ בן n ביטים חייב לגרום להתנגשות בין שני קבצים (ולכן המידע לא משומר במלואו - לא ניתן לשחזר כל קובץ מהכיווץ שלו). טיעון קצת יותר מחוכם מוכיח שאם הכיווץ מקטין ולו קובץ בודד, הוא חייב להגדיל קובץ אחר כלשהו.

נעבור כעת לדוגמאות מורכבות יותר.

נתון משולש שווה צלעות עם צלע באורך 1. יש להוכיח כי לכל 5 נקודות במשולש יש שתיים במרחק קטן או שווה ל- $\frac{1}{2}$.

הפתרון: מחלקים את המשולש ל-4 משולשים שווים צלעות שאורך צלעם $\frac{1}{2}$. המרחק בין שתי נקודות בתוך כל משולש הוא לא יותר מ- $\frac{1}{2}$, ועל פי עקרון שובך היונים יש שתי נקודות באותו משולש (הנקודות הן היונים, המשולשים הם השובכים).

¹פרדוקס יום ההולדת בתורת ההסתברות מראה שכבר אם ישנם 23 אנשים בחדר וימי ההולדת שלהם מתפלגים באופן אחיד, ההסתברות לשני אנשים בעלי אותו יום הולדת גדולה מחצי.

שישה אנשים נפגשו במסיבה וחלקם לחצו ידיים אחד לשני. יש להוכיח כי יש שלישייה של אנשים כך שכל חברה או לחצו את ידיהם של כל חבריהם לשלישייה, או לחצו את ידו של אף חבר בשלישייה.

בניסוח גאומטרי, נתבונן במצולע משוכלל בן 6 קודקודים כך שכל האלכסונים האפשריים נמתחו בו (כלומר, כל קודקוד מחובר בקו לכל קודקוד אחר). נצבע כל אחד מהקווים באדום או כחול; יש להוכיח כי קיים משולש מונוכרומטי (שכל צלעותיו צבועות באותו הצבע).

הפתרון: נתבונן על אדם מס' 1. ישנם 5 קטעים שמחברים אותו עם שאר האנשים, ומעקרון שובך היונים המוכלל יש שלושה הצבועים באותו הצבע (הקווים הם היונים, הצבעים הם השובכים). נניח בלי הגבלת הכלליות שהצבע הזה היה אדום נתבונן על שלושת האנשים המחברים לקווים הללו. אם קיים ביניהם זוג שהקו שמחבר אותו הוא בצבע אדום, אז ביחד עם אדם מס' 1 קיבלנו את השלישייה שלנו; ואם לא קיים ביניהם זוג כזה אז כל שלושת האנשים הללו מחוברים אלו לאלו עם קווים כחולים, ושוב קיבלנו את השלישייה שלנו.

בהערת אגב נציין שתוצאה זו היא מקרה פרטי של משפט כללי בקומבינטוריקה הנקרא משפט רמזי, ובתורו מהווה בסיס לתחום בקומבינטוריקה הנקרא תורת רמזי. לא נציג את המשפט בקורס.

בכל קבוצה של 12 מספרים טבעיים דו ספרתיים קיימים שניים אשר הפרשם הוא מספר בעל שתי ספרות זהות.

הפתרון: השאריות האפשריות בחלוקה ב-11 של המספרים יהיו השובכים, וה-11 מספרים יהיו היונים. בהכרח יש שני מספרים בעלי אותה שארית בחלוקה ב-11 ולכן הפרשם יתחלק ב-11, ומכיוון שהוא מספר דו ספרתי הוא יהיה בעל שתי ספרות זהות. הייצוג העשרוני של כל מספר רציונלי הוא מחזורי.

כדי למצוא את הייצוג העשרוני של מספר רציונלי $\frac{a}{b}$ (עם $a < b$) מבצעים חילוק ארוך; ניתן לתאר זאת כחזרה אינסופית על הצעדים הבאים:

$$1. a \leftarrow 10 \cdot a$$

$$2. \left[\frac{a}{b} \right]$$

$$3. a \leftarrow a \% b$$

האלגוריתם עצמו הוא אינסופי, אבל יש רק מספר סופי של ערכים ש- a יכול לקבל (הערכים בין 0 ו- b) ומכאן שהחל משלב מסויים האלגוריתם יחל לחזור על עצמו, שכן ערכו של a בשלב מסויים קובע באופן יחיד את כל המשך האלגוריתם.²

4 הבינום של ניוטון ומשולש פסקל

כולם מכירים מבית הספר את נוסחת הכפל המקוצר $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. הנוסחה $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ גם היא מוצגת בבית הספר אבל זכורה פחות.

נראה כעת כיצד מגיעים לנוסחאות אלו וכיצד שיטה זו מטפלת גם במקרה הכללי של $(a + b)^n$.

²רעיון זה, לפיו ריצה אינסופית של אלגוריתם שיכול להיות רק במספר סופי של "מצבים", תחיל חזרות משלב מסויים הוא שימושי ביותר ובא לידי ביטוי, למשל, בלמת הניפוח בקורס באוטומטים ושפות פורמליות, ופתרון של וריאנטים מוגבלים של בעיית העצירה בקורס בתורת החישוביות.

ראשית, נשים לב ש-

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= (a+b)(a+b) = aa + ab + ba + bb \\ &= a^2 + 2ab + b^2\end{aligned}$$

ה- $2ab$ נובע מ- $ab + ba$ ומכך שכפל הוא קומוטטיבי, כלומר $ab = ba$.
באופן דומה:

$$\begin{aligned}(a+b)^3 &= (a+b)(a+b)(a+b) \\ &= aaa + aab + aba + abb + baa + bab + bba + bbb\end{aligned}$$

כאן ישנם שמונה מחוברים, שכל אחד מתקבל על ידי בחירה של a -ים מחלק מהסוגריים ו- b -ים מהסוגריים הנוותרים. למשל, aba מתקבל מבחירה של a בסוגריים הראשונים והאחרונים ו- b באמצעיים.
באופן כללי, $(a+b)^n$ הוא סכום של מחוברים שכל אחד מהם מתקבל מבחירה של i פעמים a מחלק מהסוגריים ו- $n-i$ פעמים b מהנוותרים, וזאת לכל $0 \leq i \leq n$. האיבר $a^i b^{n-i}$ יכול להיבחר בדיוק $\binom{n}{i}$ פעמים - מספר האפשרויות לבחור את i זוגות הסוגריים שמתוכם נבחר a (או באופן שקול, $\binom{n}{n-i} = \binom{n}{i}$) אפשרויות לבחור את הסוגריים שמהם יילקחו ה- b -ים).
מכאן אנו מגיעים לנוסחה הכללית:

$$טענה 4.1 \text{ (הבינום של ניוטון)} \quad (a+b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i}$$

בשל נוסחה זו המספרים $\binom{n}{i}$ מכונים לעתים קרובות מקדמי הבינום. יש למקדמי הבינום תיאור גרפי נאה הנקרא משולש פסקל (אף כי לא פסקל המציא אותו - המשולש היה מוכר כבר בימי הביניים, ופסקל בסך הכל תיאר אותו בספר מתמטיקה שכתב):

				1			
				1	1		
			1	2	1		
		1	3	3	1		
	1	4	6	4	1		
1	5	10	10	5	1		

בשורה ה- n -ית של המשולש נמצאים המספרים $\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots, \binom{n}{n}$.
נשים לב למספר תכונות של המשולש ולאחר מכן נוכיח אותן:

1. המשולש סימטרי.
2. שפת המשולש מורכבת כולה מ-1-ים.
3. הכניסות שליד השפה בשורה ה- n הן n .

4. כל איבר במשולש הוא סכום שני האיברים שמעליו (ובמקרה של איברים בשפה, של האיבר היחיד שמעליו).

5. סכום השורה ה- n הוא 2^n (נובע בקלות מנוסחת הבינום, כאשר מציבים בה $a = b = 1$).

6. סכום המקומות הזוגיים בשורה ה- n במשולש הוא 2^{n-1} (ולכן גם סכום המקומות האי זוגיים הוא 2^{n-1}).

נוכיח כל תכונה בשתי דרכים - אלגברית (כלומר, על ידי מניפולציה של משוואות) וקומבינטורית (כלומר, על ידי תיאור בעיית ספירה מתאימה).

1. זוהי בעצם הטענה $\binom{n}{i} = \binom{n}{n-i}$.
 הוכחה אלגברית: $\binom{n}{i} = \frac{n!}{i!(n-i)!} = \frac{n!}{(n-i)!i!} = \binom{n}{n-i}$.
 הוכחה קומבינטורית: מספר הדרכים לבחור i איברים מתוך n הוא כמו מספר הדרכים לבחור אילו $n-i$ איברים מתוך n לא לקחת.

2. זוהי בעצם הטענה $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ (השוויון הראשון נובע מהסימטריה).
 הוכחה אלגברית: $\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!n!} = \frac{n!}{n!} = 1$.
 הוכחה קומבינטורית: יש רק דרך אחת לבחור 0 מ- n איברים - לא בוחרים אף אחד.

3. זוהי בעצם הטענה $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$ (שוב, השוויון הראשון נובע מהסימטריה).
 הוכחה אלגברית: $\binom{n}{1} = \frac{n!}{1!(n-1)!} = \frac{n \cdot (n-1)!}{(n-1)!} = n$.
 הוכחה קומבינטורית: יש n דרכים לבחור איבר בודד מתוך n .

4. זוהי בעצם הטענה $\binom{n}{i} = \binom{n-1}{i-1} + \binom{n-1}{i}$ (שנכונה עבור $0 < i < n$).
 הוכחה אלגברית:

$$\begin{aligned} \binom{n-1}{i-1} + \binom{n-1}{i} &= \frac{(n-1)!}{(i-1)!(n-i)!} + \frac{(n-1)!}{i!(n-i-1)!} \\ &= (n-1)! \left[\frac{i}{i!(n-i)!} + \frac{(n-i)}{i!(n-i)!} \right] \\ &= (n-1)! \cdot \frac{n}{i!(n-i)!} = \frac{n!}{i!(n-i)!} = \binom{n}{i} \end{aligned}$$

הוכחה קומבינטורית: מספר הדרכים לבחור i איברים מתוך n הוא כמספר הדרכים לבחור $i-1$ איברים מתוך $n-1$ הראשונים ולהוסיף אליהם את האחרון, ועוד מספר הדרכים לבחור i איברים מתוך $n-1$ הראשונים מבלי להוסיף להם את האחרון (נובע מעקרון החיבור). זוהי הוכחה פשוטה וקלה לזכירה בהרבה מההוכחה האלגברית.

5. זוהי בעצם הטענה $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = 2^n$.
 הוכחה אלגברית: מהבינום של ניוטון עולה ש- $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} 1^i 1^{n-i} = (1+1)^n = 2^n$.

הוכחה קומבינטורית: $\binom{n}{i}$ הוא מספר הוקטורים הבינאריים מאורך n עם בדיוק i אפסים.

2^n הוא מספר הוקטורים הבינאריים הכולל מאורך n , ועל פי עיקרון החיבור הוא שווה לסכום מספרם של כל הוקטורים הבינאריים עם בדיוק i אפסים לכל i .

6. זוהי בעצם הטענה $\sum_{i=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2i} = 2^{n-1}$.
 הוכחה אלגברית: לכל $i > 0$ ראינו ש- $\binom{n-1}{2i} + \binom{n-1}{2i-1} = \binom{n}{2i}$, וכמו כן $\binom{n}{0} = \binom{n-1}{-1} + \binom{n-1}{0}$.
 $\sum_{i=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2i} = 2^{n-1} = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n}{i} = 2^{n-1}$ ולכן נקבל $\binom{n-1}{0} = 2^{n-1}$.
 הוכחה קומבינטורית: מספר הוקטורים הבינאריים מאורך n שבהם מספר זוגי של אפסים שווה למספר הוקטורים הבינאריים מאורך n שבהם מספר אי זוגי של אפסים: התאמה חח"ע ועל ביניהם מתקבל מהפיכת הביט הראשון בוקטור. יש סה"כ 2^n וקטורים ולכן בדיוק חצי מהם יהיו עם מספר זוגי של אפסים, כלומר 2^{n-1} .

5 אינדוקציה ורקורסיה

5.1 אינדוקציה מתמטית

אינדוקציה מתמטית היא אחת מטכניקות ההוכחה הבסיסיות והשימושיות ביותר במתמטיקה. אינדוקציה פירושה הסקה מהפרט אל הכלל; במתמטיקה פירושה שדי להוכיח טענה עבור "מקרי בסיס" פשוטים ולהראות כיצד ניתן להסיק את נכונות הטענה עבור מקרה מורכב ממקרים פשוטים יותר, בכדי להוכיח שהטענה נכונה תמיד. ניתן לחשוב על אינדוקציה כעל דומינו: בסיס האינדוקציה מפיל את האבן הראשונה, וצעד האינדוקציה מראה כיצד כל אבן נופלת מפילה את הבאה אחריה. התוצאה היא שכל האבנים נופלות.
 נציג מספר סוגים של אינדוקציה:

טענה 5.1 (אינדוקציה על הטבעיים במשתנה יחיד) אם A_0, A_1, A_2, \dots היא סדרה של טענות, כך שמתקיימים שני התנאים הבאים:

1. (בסיס האינדוקציה) A_0 נכונה.

2. (צעד האינדוקציה) אם A_i נכונה, אז גם A_{i+1} נכונה.

אז כל הטענות A_0, A_1, A_2, \dots נכונות.

הוכחה: נניח בשלילה כי 1 ו-2 נכונים אך לא כל הטענות A_1, A_2, \dots נכונות, ויהא n הטבעי הקטן ביותר כך ש- A_n אינו נכון. בשל 1 לא ייתכן ש- $n = 1$, ולכן A_{n-1} היא טענה מתוך הסדרה A_1, A_2, \dots ומכיוון ש- n היה מינימלי, A_{n-1} כן נכונה ומ-2 עולה שגם A_n נכונה, בסתירה להנחת השלילה. ■

הוכחה זו מסתמכת על כך שלכל תת קבוצה של טבעיים יש איבר מינימלי; תכונה זו מכונה "סדר טוב", ואינדוקציה ניתנת להגדרה בכל קבוצה שיש בה סדר טוב, אך לא נפרט על כך בקורס.

כשל נפוץ בהוכחות באינדוקציה מתואר על ידי ה"הוכחה" הבאה שכל הסוסים בעלי אותו הצבע. פורמלית, שבכל קבוצה של סוסים, כל הסוסים בעלי אותו צבע. האינדוקציה היא על גודל הקבוצה ומתחילה מ-1.

1. (בסיס) בקבוצה של סוס בודד כל הסוסים באותו הצבע שכן קיים בה רק סוס בודד.

2. (צעד) בהינתן קבוצה בעלת $n+1$ סוסים נוציא את אחד הסוסים החוצה וניוותר עם n סוסים שכולם באותו הצבע. כעת נחזיר את הסוס לקבוצה ונוציא סוס

אחר ושוב נקבל קבוצה שבה כל הסוסים בעלי אותו הצבע, ולכן הסוס שהוצאנו בהתחלה הוא בעל אותו צבע כמו היתר.

הרמאות ב"הוכחה" הזו היא בכך שצעד האינדוקציה אינו עובד כאשר $n = 1$ (יש לשים לב כי עבור $n > 1$ הוא עובד, אך זה חסר משמעות).

טענה 5.2 (אינדוקציה שלמה על הטבעיים במשתנה יחיד) אם A_0, A_1, A_2, \dots היא סדרה של טענות, כך שמתקיימים שני התנאים הבאים:

1. (בסיס האינדוקציה) A_0 נכונה.

2. (צעד האינדוקציה) אם A_1, A_2, \dots, A_i נכונות כולן, אז גם A_{i+1} נכונה.

אז כל הטענות A_0, A_1, A_2, \dots נכונות.

אינדוקציה שלמה נבדלת מאינדוקציה "רגילה" בכך שקל יותר להוכיח את צעד האינדוקציה מכיוון שניתן להיעזר בנכונות כל הטענות A_1, \dots, A_i ולא רק ב- A_i עצמה; עם זאת, לרוב אין בה צורך.

טענה 5.3 (אינדוקציה דו ממדית) אם $A_{i,j}$ היא קבוצה של טענות ($i, j \geq 0$ טבעיים) כך שמתקיימים שני התנאים הבאים:

1. (בסיס) $A_{0,0}$ נכונה.

2. (צעד) אם $A_{a,b}$ נכונה לכל $a \leq i, b \leq j$ וגם $(i, j) \neq (a, b)$, אז גם $A_{i,j}$ נכונה.

אז כל הטענות $A_{i,j}$ נכונות.

5.2 רקורסיה

הגדרה רקורסיבית היא הגדרה של סדרה או פונקציה (או אובייקטים כלליים יותר) שבה כל ערך מוגדר באמצעות הערכים של קודמיו, פרט למספר ערכים התחלתיים שמוגדרים במפורש.

נוסחה רקורסיבית היא לעתים קרובות פשוטה יותר מנוסחה סגורה עבור אותה סדרה (ולעתים ניתן למצוא נוסחה רקורסיבית אף שאין נוסחה סגורה פשוטה) אך היא יותר קשה לחישוב בפועל (שכן כדי לחשב ערך כלשהו באמצעותה יש לחשב קודם כל את הערכים שהוא מסתמך עליהם).

נראה מספר דוגמאות לנוסחאות רקורסיביות המגדירות סדרה, ובנוסף גם הנו-סחאות הסגורות המתאימות. בפרט, כל נוסחאות הספירה שתיארנו בפרק 2 ניתנות לתיאור כנוסחאות רקורסיביות (ואת חלקן גם תיארנו כד מבלתי לציין במפורש כי זה מה שאנו עושים).

• סדרה חשבונית: $a_n = a_{n-1} + d$ (הנוסחה הסגורה: $a_n = a_1 + (n-1)d$).

• סדרה הנדסית: $a_n = a_{n-1} \cdot q$ (הנוסחה הסגורה: $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$).

• סדרת פיבונאצ'י: $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, עם תנאי התחלה $a_0 = 0, a_1 = 1$ (בהמשך

הקורס נראה כיצד מוצאים את הנוסחה הסגורה, $a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$).

• סידורים בשורה: $P_n = n \cdot P_{n-1}$ (נוסחה סגורה: $P_n = n!$, כפי שכבר ראינו).

- בחירה בלי חזרות ועם חשיבות לסדר: $P_n^k = n \cdot P_{n-1}^{k-1}$ עם תנאי ההתחלה $P_n^0 = 1$ לכל n (נוסחה סגורה: $P_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$).
- בחירה עם חזרות ועם חשיבות לסדר: $PP_n^k = n \cdot PP_n^{k-1}$ עם תנאי ההתחלה $PP_n^0 = 1$ (נוסחה סגורה: $PP_n^k = n^k$).
- בחירה בלי חזרות ובלי חשיבות לסדר: $C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k$ עם תנאי ההתחלה $C_n^0 = 1$ ו- $C_n^n = 1$ (נוסחה סגורה: $C_n^k = \binom{n}{k}$).
- בחירה עם חזרות ובלי חשיבות לסדר: $CC_n^k = CC_{n-1}^{k-1} + CC_{n-1}^k$ עם תנאי ההתחלה $C_0^0 = 1$ ו- $C_0^k = 1$ (נוסחה סגורה: $CC_n^k = \binom{n+k-1}{k}$).

נציג כעת דוגמה מעט יותר מורכבת:

הפרת סדר על n איברים היא תמורה על המספרים $1, 2, \dots, n$ שבה לכל $1 \leq i \leq n$, המספר ה- i אינו נמצא במקום ה- i . למשל, 312 היא הפרת סדר על 3 איברים ואילו 321 לא (כי 2 נמצא במקום 2).

נסמן ב- D_n את מספר הפרות הסדר על n איברים. ניתן לחשב את D_n כך: עבור 1 , יש לנו $(n-1)$ בחירות של מקום עבורו (כי את מקום 1 לא ניתן לבחור בשבילו). לאחר מכן אנו נותרים עם $n-1$ מספרים שיש לסדר. נאמר ששמנו את 1 במקום i , אז יש שתי אפשרויות: או ש- i יושב במקום 1, או שלא. אם הוא מושם במקום 1, אז אפשר לשכוח הן מ-1 והן מ- i ולטפל ב- $n-2$ המספרים הנותרים באופן בלתי תלוי, כלומר יש D_{n-2} הפרות סדר במקרה זה; ואילו אם i אינו מושם במקום מס' 1, אז אפשר לחשוב על i כאילו הוא עצמו המספר 1 ואסור לו להיות במקום 1, וזהו התנאי הרגיל של הפרות סדר, ולכן יש לנו D_{n-1} הפרות סדר במקרה זה. קיבלנו את הנוסחה הרקורסיבית $D_n = (n-1)[D_{n-1} + D_{n-2}]$. בהערת אגב נציין שלא קיימת נוסחה סגורה קומבינטורית, אך ידוע כי $D_n = \left\lfloor \frac{n!}{e} \right\rfloor$ (הסוגריים המרובעים מציינים את פונקציית הערך השלם - המספר הטבעי הקרוב ביותר ל- $\frac{n!}{e}$).

6 כלל ההכלה וההפרדה

נתונות שתי קבוצות A, B ואנו מעוניינים לדעת מהו $|A \cup B|$. אם הקבוצות זרות (ללא איברים משותפים) אז $|A \cup B| = |A| + |B|$ - זהו עקרון החיבור. אך מה קורה אם הקבוצות אינן זרות, כלומר הקבוצה $A \cap B$ של האיברים המשותפים לשתיהן אינה ריקה?

במקרה זה הבעיה ב- $|A| + |B|$ הוא שאיברים משותפים ל- A, B נספרים פעמיים; פעם כאיברי A ופעם כאיברי B . את הטעות הזו ניתן "לתקן" על ידי כך שמחסרים מהסכום הכולל את מספר האיברים שנספרו פעמיים, כלומר נקבל את הנוסחה:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

נוסחה זו נכונה לכל זוג קבוצות A, B .

נעבור כעת למקרה של שלוש קבוצות: $|A \cup B \cup C|$. ניתן היה לקוות שגודל הקבוצה יהיה $|A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C|$ אך זה אינו נכון ומעיד על כך שלא ניתן להסתפק בבחינת זוגות של קבוצות בלבד. הבעיה היא שאיבר שנמצא בכל שלוש הקבוצות ייספר בחיוב שלוש פעמים (עם $|A|, |B|, |C|$) אבל גם לשלילה שלוש

פעמים (עם $|A \cap B|, |A \cap C|, |B \cap C|$). לכן כדי לתקן אנו מחברים את $|A \cap B \cap C|$ ומקבלים את הנוסחה הנכונה:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

מכאן אנו מגיעים באופן טבעי למקרה הכללי:

משפט 6.1 (כלל ההכלה וההפרדה) אם A_1, \dots, A_n הן קבוצות אז

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{1 \leq i \leq n} |A_i| - \sum_{1 \leq i, j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i, j, k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap \dots \cap A_n|$$

הוכחה: יש להראות שכל איבר של $\bigcup_{i=1}^n A_i$ נספר בדיוק פעם אחת באגף ימין, אחרי שמקזזים ספירות חיוביות ושליליות.

נניח שהאיבר מופיע בדיוק ב- t מתוך n הקבוצות. מספר הפעמים שבהן הוא נספר באותו איבר בסכום שבו רצים על חיתוכים של i קבוצות תלוי ב- i ; אם $i > t$ אז האיבר אינו נספר כלל כי בחיתוך של i קבוצות בהכרח משתתפת בחיתוך קבוצה שאינה מכילה אותו. לעומת זאת, אם $i \leq t$ אז הוא מופיע בדיוק ב- $\binom{t}{i}$ מהחיתוכים - אלו שבהם משתתפות רק קבוצות שמכילות אותו.

על כן, הספירה עבור אותו איבר היא $\sum_{i=1}^t (-1)^{i-1} \binom{t}{i}$, כעת, מהבינום של ניוטון:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^t (-1)^{i-1} \binom{t}{i} &= 1 - \sum_{i=0}^t (-1)^i \binom{t}{i} \\ &= 1 - (1-1)^t = 1 \end{aligned}$$

כנדרש. ■

לרוב השימוש שלנו לעקרון ההכלה וההפרדה הוא כזה: נתון "עולם" בן n איברים, ומספר קבוצות A_1, \dots, A_k שאבריהן נלקחים מתוך העולם ואנו חושבים עליהן כעל "תכונות רעות" שהאיברים יכולים לקיים. מטרתנו היא למצוא את כמות האיברים שאינם מקיימים אף תכונה רעה, כלומר את $\left| \bigcap_{i=1}^k \overline{A_i} \right|$. מעקרון ההכלה וההפרדה נקבל:

$$\left| \bigcap_{i=1}^k \overline{A_i} \right| = n - \left| \bigcup_{i=1}^k A_i \right| = n - \sum |A_i| + \dots + (-1)^n |A_1 \cap \dots \cap A_n|$$

ניסוח נוסף שהוא נוח מעט יותר לעבודה הוא זה: אם ישנם n איברים ו- k תכונות P_1, \dots, P_k , נסמן ב- $w(P_i)$ את מספר האיברים שמקיימים את P_i , ב- $w(P_i P_j)$ את

מספר האיברים שמקיימים גם את P_i וגם את P_j , וכן הלאה, ולכל מספר טבעי r נשתמש בסימון $w(r) = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_r \leq k} w(P_{i_1} \cdots P_{i_r})$ (לסימון זה אין משמעות קו-מבינטורית; אותו איבר יכול להיספר בו כמה וכמה פעמים). נקבל את הניסוח הבא של כלל ההכלה וההפרדה:

משפט 6.2 (כלל ההכלה וההפרדה, ניסוח באמצעות תכונות) יהא $E(0)$ מספר האיברים שאינם מקיימים אף תכונה, אז:

$$E(0) = \sum_{r=0}^k (-1)^r w(r)$$

מבין המספרים $1, 2, \dots, 300$, כמה אינם מתחלקים ב-3, 7 או 11?
 כאן "תכונה רעה" היא התחלקות ב-3, 7 או 11 - כלומר, יש לנו שלוש תכונות, שנסמן P_3, P_7, P_{11} . יש 300 מספרים ולכן $w(0) = 300$.
 קל לראות כי $w(P_3) = \lfloor \frac{300}{3} \rfloor = 100$, $w(P_7) = \lfloor \frac{300}{7} \rfloor = 42$, $w(P_{11}) = \lfloor \frac{300}{11} \rfloor = 27$.
 כמו כן מכיוון ש-3, 7, 11 כולם ראשוניים, מספר מתחלק בכמה מהם רק אם הוא מתחלק במכפלה שלהם. כלומר:
 $w(P_3 P_7) = \lfloor \frac{300}{21} \rfloor = 14$, $w(P_3 P_{11}) = \lfloor \frac{300}{33} \rfloor = 9$, $w(P_7 P_{11}) = \lfloor \frac{300}{77} \rfloor = 3$.
 $w(2) = 3 + 9 + 14 = 26$
 ולסיים $w(P_3 P_7 P_{11}) = \lfloor \frac{300}{231} \rfloor = 1$ ולכן $w(3) = 1$.
 מנוסחת ההכלה וההפרדה נקבל כי כמות המספרים שאינם מתחלקים ב-3, 7, 11 היא בדיוק

$$\begin{aligned} E(0) &= w(0) - w(1) + w(2) - w(3) \\ &= 300 - 169 + 26 - 1 \\ &= 156 \end{aligned}$$

הפתרון עשוי להיראות טרחני ומסובך, אך בפועל הכלה והפרדה משפרת משמעותית את הסיבוכיות של אלגוריתם שמבצע אותה אוטומטית; פתרון נאיבי לבעיה שלעיל דורש לעבור על כל 300 המספרים ולבדוק לכל אחד מהם התחלקות; הפתרון עם הכלה והפרדה דורש חישוב 7 פעולות חילוק בלבד ועוד ביצוע של מספר פעולות סיכום שעלותן זניחה. באופן כללי אם הטווח שלנו הוא עד n ואנו בודקים התחלקות ב- k ראשוניים אז פתרון נאיבי דורש $O(n \cdot k)$ פעולות חילוק, ופתרון עם הכלה והפרדה דורש $O(2^k)$ פעולות כאלו, כך שעבור k קטן (ובפרט קבוע) ו- n גדול מדובר על פתרון יעיל משמעותית.

יהא D_n מספר הפרות הסדר על n איברים: פרמוטציות של $1, \dots, n$ שבהן לכל i המספר i אינו נמצא במקום ה- i . נחשב מספר זה באמצעות כלל ההכלה וההפרדה.

התכונה P_i תהיה התכונה "המספר i נמצא במקום ה- i ".
 הסימטריה של הבעיה מקלה מאוד על חישוב $w(r)$ במקרה זה. לכל r , ראשית נבחר r מתוך n מקומות שאנחנו רוצים "לקלקל" ($\binom{n}{r}$ אפשרויות), ולאחר מכן נספור את מספר התמורות שבהן המקומות שבחרנו "מקולקלים". ייתכן שעוד מקומות יהיו מקולקלים אך זה לא משנה עבורנו (זה בדיוק הכוח שבהכלה והפרדה). כדי לקלקל r מקומות אנחנו מציבים בכל אחד מהם את המספר שמקלקל אותו, ואז נותרים לנו

$n-r$ מקומות שבהם אפשר לסדר באופן חופשי את המספרים, כלומר יש לנו $(n-r)!$ אפשרויות.

בסך הכל קיבלנו כי $w(r) = \binom{n}{r} (n-r)! = \frac{n!}{r!}$, ומכאן נקבל:

$D_n = \sum_{r=0}^n (-1)^r w(r) = \sum_{r=0}^n (-1)^r \frac{n!}{r!} = n! \sum_{r=0}^n \frac{(-1)^r}{r!}$
 תזכורת מחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: $e^x = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{x^r}{r!}$, ולכן $e^{-1} = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{(-1)^r}{r!}$.
 מכאן ש- $\sum_{r=0}^n \frac{(-1)^r}{r!}$ הוא קירוב של e^{-1} , וגודל הטעות הוא זניח. מכאן ש- $D_n \approx \frac{n!}{e}$,
 ובפועל ניתן לראות ש- $D_n = \lfloor \frac{n!}{e} \rfloor$ הוא המספר הטבעי הקרוב ביותר ל- $\frac{n!}{e}$ לכל n .
 מכאן אנו רואים שכלל ההכלה וההפרדה סייע לנו למצוא נוסחה מדויקת עבור D_n .
 אף אם הוא לא נתן אותה במפורש בעצמו.

7 חלוקות

נחזור כעת לבעיה שכבר עסקנו בה: בכמה דרכים ניתן לחלק n כדורים ל- k תאים, בהינתן אילוצים מסויימים?
 נראה את הפתרון עבור הרבה מהאילוצים האפשריים.

1. n כדורים זהים, k תאים שונים ולכל היותר כדור אחד בכל תא: כאן יש לבחור את n מתוך k התאים שבהם יושמו כדורים. בגלל שהכדורים זהים אין חשיבות לסדר הבחירה. בגלל שיש כדור אחד לכל היותר בכל תא אין חזרות בבחירה. מסקנה: $\binom{k}{n}$ אפשרויות.

2. n כדורים שונים, k תאים שונים ולכל היותר כדור אחד בכל תא: גם כאן בוחרים את n מתוך k התאים שבהם יושמו כדורים. בגלל שהכדורים שונים יש חשיבות לסדר הבחירה. בגלל שיש כדור אחד לכל היותר בכל תא אין חזרות בבחירה. מסקנה: $P_k^n = \binom{k}{n} n!$ אפשרויות.

3. n כדורים שונים, k תאים שונים, ללא מגבלות נוספות: כאן לכל כדור בוחרים אחד מ- n התאים האפשריים. בגלל שהכדורים שונים יש חשיבות לסדר הבחירה. בגלל שאין מגבלות נוספות זו בחירה עם חזרות. מסקנה: k^n אפשרויות.

4. n כדורים זהים, k תאים שונים, ללא מגבלות נוספות: כאן לכל כדור בוחרים אחד מ- k התאים האפשריים. בגלל שהכדורים זהים אין חשיבות לסדר הבחירה. בגלל שאין מגבלות נוספות זו בחירה עם חזרות. מסקנה: $CC_k^n = \binom{n+k-1}{n}$ אפשרויות.

5. n כדורים שונים, k תאים שונים, סדר הכדורים בכל תא חשוב: כאן לא ניתן לכל כדור לבחור תא (כי בצורה כזו לא ניתן לקבל, למשל, שכדור מס' 1 נמצא אחרי כדור מס' 2 באותו התא).

פתרון: ראשית כל מחלקים n כדורים זהים לתאים. לאחר מכן בוחרים תמורה של $1, \dots, n$ וממספרים את הכדורים על פי התמורה וסדר הופעתם בתאים. סה"כ $n! \cdot CC_k^n$ אפשרויות.

6. n כדורים שונים, k תאים שונים, אין תא ריק. עבור $k > n$ התשובה היא 0 ולכן נניח כי $k \leq n$. אם הכדורים היו זהים, הפתרון היה לחלק כדור לכל תא ואז לחלק את $n - k$ הנוותרים בלי חשיבות לסדר ועם חזרות. נסיון לנקוט בגישה זו כאן יוביל לספירה כפולה (אם 1, 2 באותו תא זה ייספר פעם אחת כאשר 1 ייבחר להיות כדור שמ-חולק בשלב הראשון ו-2 מחולק בשלב השני, ופעם כש-2 מחולק בשלב הראשון ו-1 בשלב השני).

במקום זאת נפתור באמצעות הכלה והפרדה. התכונה P_i תהיה "התא i ריק". את $w(r)$ נחשב באופן הבא: מספר הדרכים לבחור r מתוך k תאים כדי שיהיו ריקים $\binom{k}{r}$, וחלוקה חופשית של כדורים ל- $k - r$ התאים הנוותרים $(k - r)^n$. נקבל את הפתרון $T(n, k) = \sum_{r=0}^k (-1)^r \binom{k}{r} (k - r)^n$ אפשויות. למרבה הצער, אין נוסחה סגורה.

7. n כדורים שונים, k תאים זהים, אין תא ריק. זהו ניסוח שקול ל"חלוקה של n מספרים ל- k קבוצות זרות לא ריקות". מספר זה, $S(n, k)$, נקרא "מספר סטירלינג מהסוג השני" ומסומן לפעמים $\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\}$. פתרון: נחלק את הכדורים ל- k תאים שונים - $T(n, k)$. כעת נחלק במספר הסדרים הפנימיים של תאים ונקבל $S(n, k) = \frac{T(n, k)}{k!}$.

8. n כדורים שונים, מספר כלשהו של תאים שונים ואין תא ריק: מהתנאים נובעת הדרישה $k \leq n$, ולכל k נקבל $T(n, k)$ כמקודם. התשובה היא $Q(n) = \sum_{k=1}^n T(n, k) = \sum_{k=1}^n \sum_{r=0}^k (-1)^r \binom{k}{r} (k - r)^n$.

9. n כדורים שונים, מספר כלשהו של תאים זהים ואין תא ריק. מספר זה, $B(n)$, נקרא "מספר בל" כמו ב-8, גם כאן אפשר להציג את הפתרון כסכום, הפעם של מספרי סטירלינג מהסוג השני:

$$B(n) = \sum_{k=1}^n S(n, k)$$

10. n כדורים זהים, k תאים זהים ואין תא ריק. מסומן ב- $p_k(n)$ זהה למספר טבלאות יאנג: טבלה עם k שורות ו- n משבצות בסך הכל, כך שבכל שורה אין יותר משבצות מאשר בשורה שקדמה לה. זהה למספר האפשרויות לכתוב את n כסכום של k מספרים טבעיים שמסודר-ים בסדר עולה (למשל: $3 = 1 + 2 = 1 + 1 + 1$ הן שלוש אפשרויות החלוקה של 3).

קיימת נוסחת הנסיגה הבאה:

$$p_k(n) = p_{k-1}(n-1) + p_k(n-k)$$
כאן המחובר הראשון מתאים לסיטואציה שבה באחד התאים יש בדיוק כדור אחד, והמחובר השני מתאים לסיטואציה שבה בכל התאים יש לפחות שני כדורים.

תנאי התחלה:
 $p_0(0) = 1$ (חלוקה "ריקה" של אפס כדורים לאפס תאים)
 $p_k(n) = 0$ כאשר $n \leq 0$ ו- $k > 0$ (אם יש מספר חיובי של תאים ואין כדורים, לא ניתן לקיים את התנאי שאין תא ריק).
 $p_0(n) = 0$ כאשר $n > 0$ (אם אין תאים ויש כדורים, אין שום דרך לחלק אותם).

11. n כדורים זהים, מספר כלשהו של תאים זהים ואין תא ריק. מסומן ב- $p(n)$. בבירור $p(n) = \sum_{k=1}^n p_k(n)$, אך קשה לומר משהו מעבר לכך. "פונקציית החלוקה" - היא מהפונקציות המפורסמות בקומבינטוריקה ובתורת המספרים ועבודה רבה (החורגת מהיקף הקורס) הושקעה בהבנה של התנהגותה.

נסכם את כל המקרים הללו בטבלה הבאה:

מקרה	כדורים	תאים	סדר בתא	תאים ריקים	הגבלות נוספות	נוסחה/סימון
1	זהים	שונים	אין	אפשר	1 בתא לכל היותר	$\binom{k}{p}$
2	שונים	שונים	אין	אפשר	1 בתא לכל היותר	$\frac{k!}{(n-k)!}$
3	שונים	שונים	אין	אפשר	אין	k^n
4	זהים	שונים	אין	אפשר	אין	$\binom{n+k-1}{n}$
5	שונים	שונים	יש	אפשר	אין	$n! \cdot CC_k^n$
6	שונים	שונים	אין	אי אפשר	אין	$T(n, k)$
7	שונים	זהים	אין	אי אפשר	אין	$S(n, k)$
8	שונים	שונים	אין	אי אפשר	מספר תאים כלשהו	$Q(n)$
9	שונים	זהים	אין	אי אפשר	מספר תאים כלשהו	$B(n)$
10	זהים	זהים	אין	אי אפשר	אין	$p_k(n)$
11	זהים	זהים	אין	אי אפשר	מספר תאים כלשהו	$p(n)$

8 פונקציות יוצרות

מרבית הבעיות שבהן עוסקים בקומבינטוריקה הן בעיות ספירה עבור פרמטר n : לכל מספר טבעי $n \geq 0$ מתאים מספר a_n שמתאר את כמות האובייקטים שמתאימים לקריטריונים של בעיית הספירה עבור הפרמטר n הספיציפי. כך למשל D_n תיאר, לכל $n \geq 0$, את מספר הפרמוטציות מגודל n (הגודל הוא הפרמטר) שהן הפרות סדר. המטרה של הקומבינטוריקה היא להבין באופן הטוב ביותר את התנהגות הסדרה a_n . עד כה אופן הפעולה שלנו היה כזה שבו אנתנו "מקפאים" את n ומנסים למצוא נוסחה ספציפית עבור a_n , לפעמים בהסתמך על איברים אחרים בסדרה (מה שמניב נוסחת נסיגה). פונקציות יוצרות הן גישה שונה מהותית לתיאור סדרות, שמצליחות לתפוס את כל הסדרה "בבת אחת". גישה זו מאפשרת התמודדות כללית וחזקה יותר עם בעיות ספירה רבות ובפרט כאלו שלא ניתן למצוא בהן נוסחה מפורשת עבור a_n , אך במבט ראשון היא גם מבלבלת ונראית "חלשה יותר" מהשיטות שנלמדו עד כה. הרעיון בפונקציות יוצרות הוא "לשתול" את אברי הסדרה בתור מקדמים בטור חזקות אינסופי; טור שכזה מגדיר פונקציה פונקציה שלאחר מכן ניתן לבצע עליה מניפולציות סטנדרטיות שמתבצעות על פונקציות - חיבור עם פונקציות אחרות, כפל בסקלרים ובפונקציות אחרות, העלאה בחזקה ואפילו גזירה ואינטגרציה. לכל המניפולציות הללו משמעויות קומבינטוריות. המטרה היא למצוא ביטוי מפורש כלשהו לפונקציה היוצרת של הסדרה. מרגע שביטוי שכזה נמצא, ניתן להפיק ממנו לעתים נוסחה מפורשת עבור אברי הסדרה או נוסחת נסיגה עבורם, וגם במקרה שהדבר אינו מתאפשר עדיין יש מידע שניתן להפיק דוגמת קצב הגידול של הסדרה (לא ניכנס לניתוחים הללו בקורס זה).

קיימים מספר סוגים של פונקציות יוצרות ובקורס זה נציג רק את הפשוט שבהם:

הגדרה 8.1 (פונקציה יוצרת) עבור סדרה $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$, הפונקציה היוצרת של הסדרה היא הביטוי $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.

בחישוב דיפרנציאלי ואינטגרלי יש חשיבות לתחום ההתכנסות של טורי חזקות כדוגמת $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, אך אנו לא נזדקק בשום שלב להצבת ערכים בתוך x כך שפרטים אלו לא יהיו רלוונטיים עבורינו.

הפונקציה היוצרת של הסדרה הסופית 1, 2, 1 (שניתן לחשוב עליה כעל הסדרה האינסופית $(1, 2, 1, 0, 0, \dots)$ היא $f(x) = 1 + 2x + x^2$. באופן כללי, פונקציה יוצרת של סדרה היא פולינום אם ורק אם הסדרה היא סופית (מכילה רק אפסים החל ממקום מסויים).

לסדרה $\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots, \binom{n}{n}$ יש פונקציה יוצרת $f(x) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i$. באמצעות הבינום של ניוטון ניתן לפשט את הביטוי: $f(x) = (1+x)^n$. דוגמה זו מעידה על אחד מהגורמים לכוחן הרב של פונקציות יוצרות - לרוב ניתן לתת להן ביטוי פשוט שקל לבצע בו מניפולציות אלגבריות.

לסדרה $1, 1, 1, \dots$ יש פונקציה יוצרת $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$. השוויון האחרון הוא הנוסחה המוכרת לסכום של טור הנדסי. השימוש בנוסחה הזו למרות שאיננו חושבים על x כעל מספר עשוי להיות מבלבל; הסבר מדוע מבחינה מתמטית נוסחה זו תקינה לחלוטין יינתן בנספח. נעבור כעת לתיאור הפעולות הבסיסיות שניתן לבצע עם פונקציות יוצרות.

משפט 8.2 יהיו $\{a_n\}_{n \geq 0}$ ו- $\{b_n\}_{n \geq 0}$ סדרות כך ש- a_n מתאר את מספר האובייקטים מגודל n במחלקה A ו- b_n מתאר את מספר האובייקטים מגודל n במחלקה B , ויהיו $a(x), b(x)$ הפונקציות היוצרות המתאימות.

1. (חיבור) אם $C = A \cup B$ והאיחוד זר, כלומר כל אובייקט ב- C מגודל n הוא או אובייקט מגודל n ב- A או אובייקט מגודל n ב- B ו- $A \cap B = \emptyset$, אז $c(x) = a(x) + b(x)$.

2. (כפל) אם $C = A \times B$ כך שאיבר ב- C מגודל n הוא זוג של איבר מ- A ואיבר מ- B שסכום הגדלים שלהם הוא n , אז $c(x) = a(x)b(x)$.

3. (סדרה) אם $C = A^*$ כלומר איבר ב- C הוא סדרה סופית של איברים מ- A כך שגודל איבר נקבע על פי סכום גדלי אברי הסדרה ואין ב- A איברים מגודל 0, אז $c(x) = \frac{1}{1-a(x)}$.

המשפט נובע מהתכונות הבסיסיות של חיבור וכפל טורי חזקות; נוכיח אותו בנספח. נעבור כעת לדוגמאות.

אם $A = \mathbb{N}$ כך שהגודל של מספר הוא פשוט המספר עצמו, אז האיברים מגודל n ב- \mathbb{N}^k הם בדיוק ה- k -יות של מספרים טבעיים שסכומם n , דהיינו פתרון למשוואה $x_1 + \dots + x_k = n$, כלומר יש $\binom{n+k-1}{k-1}$ איברים מגודל n ב- \mathbb{N}^k . מצד שני, הפונקציה היוצרת של \mathbb{N} היא פשוט $1 + x + x^2 + \dots = \frac{1}{1-x}$ ולכן הפונקציה היוצרת של \mathbb{N}^k היא העלאה בחזקת k של $\frac{1}{1-x}$. קיבלנו את הזהות השימושית הבאה:

$$\frac{1}{(1-x)^k} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k-1} x^n$$

9 נוסחאות נסיגה ופתרון

נתונים n ישרים במישור במיקום כללי, כלומר אין שלושה ישרים שנחתכים כולם באותה הנקודה. לכמה חלקים הם מחלקים את המישור?

לא קשה לראות שאם $n - 1$ ישרים כבר מונחים במישור ומתווסף ישר חדש, הוא מוסיף למישור n חלקים חדשים - בכל פעם שבה הוא פוגש את אחד הישרים שכבר קיימים, הוא מחלק לשניים את האיזור שאליו הוא נכנס, ובנוסף לכך הוא מחלק לשניים את האיזור שבו הוא היה לפני שהוא פגש ישר כלשהו. זה נותן לנו את הנוסחה הרקורסיבית הבאה:

$$a_0 = 1 \text{ (המישור ללא ישרים כלל מורכב מחלק בודד)}$$

$$a_n = a_{n-1} + n$$

אנו מעוניינים להפיק מנוסחת הנסיגה הזו פתרון סגור למשוואה. נציג שלוש דרכים שונות לעשות זאת:

1. הצבה נשנית.

2. שיטת המשוואה האופיינית.

3. פונקציות יוצרות.

9.1 שיטת ההצבה הנשנית

בשיטה זו מסתמכים על כך שניתן להציב את המשוואה הרקורסיבית שוב ושוב בעצמה ולאחר שעושים זאת n פעמים תתקבל נוסחה שאינה רקורסיבית. התקווה היא שניתן יהיה לגלות את החוקיות שנוצרת במהלך ההצבות הנשנות הללו (מה שדורש יצירתיות לעתים).
עבור הדוגמה שלנו:

$$\begin{aligned} a_n &= a_{n-1} + n \\ &= a_{n-2} + (n + n) - 1 \\ &= a_{n-3} + (n + n + n) - (1 + 2) \\ &= a_{n-4} + (n + n + n + n) - (1 + 2 + 3) \end{aligned}$$

וכן הלאה. בבירור הצורה הכללית כאן היא $a_n = a_{n-k} + kn - (1 + 2 + \dots + (k - 1))$ ונשתמש בנוסחה לסדרה חשבונית: $1 + 2 + \dots + k - 1 = \frac{k(k-1)}{2}$, ונקבל:

$$a_n = a_{n-k} + kn - \frac{k(k-1)}{2}$$

כדי לסיים נציב $k = n$ ונשתמש בתנאי ההתחלה $a_0 = 1$ כדי לקבל:

$$a_n = 1 + n^2 - \frac{n(n-1)}{2} = \frac{2+2n^2-n^2+n}{2} = \frac{n^2+n+2}{2} = 1 + \frac{n(n+1)}{2} = 1 + \binom{n+1}{2}$$

בשלב זה מומלץ לבדוק את נכונות התוצאה על ידי הצבת ערכים קטנים בה.

9.2 שיטת המשוואה האופיינית

בשיטה זו אנו מתחילים עם "ניחוש" לצורה הכללית של הפתרון ומהצבה בנוסחה מקבלים את הפתרון במדויק. פורמלית, לאחר שנמצאה צורת הפתרון יש צורך להוכיח באינדוקציה כי זהו אכן הפתרון, שכן ההצבה אינה מוכיחה כי הפתרון נכון אלא רק מראה מה צריכים להיות הפרמטרים המדויקים של הפתרון אם צורתו היא הצורה שניחשנו.

עבור נוסחת הנסיגה שלנו ננחש שצורת הפתרון הכללי היא $a_n = An^2 + Bn + C$, נציב במשוואה הרקורסיבית ונקבל:

$$An^2 + Bn + C = A(n-1)^2 + B(n-1) + C + n$$

ואחרי פתיחת סוגריים ופישוט:

$$A(2n-1) + B = n$$

המשוואה הזו מתקיימת לכל n , ובפרט עבור $n = 0, 1$, כך שקיבלנו ממנה מייד שתי משוואות:

$$-A + B = 0$$

$$A + B = 1$$

שפתרון הוא $A = B = \frac{1}{2}$.

כמו כן מתנאי ההתחלה $a_0 = 1$ נקבל $C = 1$.

$$a_n = \frac{n^2+n}{2} + 1 = 1 + \binom{n+1}{2}$$

9.3 שימוש בפונקציות יוצרות

תהא $f(x)$ הפונקציה היוצרת של הסדרה a_n . אז מנוסחת הנסיגה ומתנאי ההתחלה אנו מקבלים את המשוואה הבאה:

$$f(x) = xf(x) + \frac{x}{(1-x)^2} + 1$$

הסבר:

ה- $xf(x)$ הוא a_{n-1} - זו ההשפעה של ביצוע "הזזה ימינה" על כל אברי הסדרה על ידי כפל ב- x .

על פי הנוסחאות שראינו קודם, ועל כן $\frac{x}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$ היא הפונקציה היוצרת של הסדרה בה האיבר ה- n הוא n (שיטה אחרת: $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = x \cdot \left(\frac{1}{1-x}\right)' = \frac{x}{(1-x)^2}$).

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = x \cdot \left(\frac{1}{1-x}\right)'\right) = \frac{x}{(1-x)^2}$$

ה- $+1$ הוא תנאי ההתחלה.

מהמשוואה לעיל נחלץ את $f(x)$ ונקבל:

$$f(x) = \frac{x}{(1-x)^3} + \frac{1}{1-x}$$

כזכור, הטור של $\frac{1}{(1-x)^3}$ הוא $\sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+2}{2} x^n$ ולכן על ידי כפל ב- x מקבלים את

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+2}{2} x^{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+1}{2} x^n$$

הטור של $\frac{1}{1-x}$ הוא $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$, ולכן נקבל שפתרון הנוסחה הוא $1 + \binom{n+1}{2}$, שוב.

חלק II

מבוא לתורת הגרפים

10 גרפים - הגדרה ודוגמאות

נפתח במספר בעיות ידועות במתמטיקה.

נתונה צורה המורכבת מקודקודים וקווים המחברים אותם. האם ניתן לצייר אותה מבלי להרים את העט מהדף?

זוהי בעיית הכרעה אלגוריתמית; מסתבר שקיים אלגוריתם יעיל ופשוט ביותר אשר מכריע אותה, ונראה אותו בהמשך הקורס. הפתרון נעוץ בחשיבה על הצורה כעל גרף

ותרגום השאלה האם ניתן לצייר אותה מבלי להרים את העט מהדף לשאלה האם קיים בגרף המתאים מסלול אוילרי.

נתונה מפה כלשהי. האם ניתן לצבוע אותה עם ארבעה צבעים בלבד, כך ששתי מדינות סמוכות אינן צבועות באותו הצבע?

זוהי בעיית ארבעת הצבעים המפורסמת מאוד, שהייתה פתוחה למעלה ממאה שנים עד שנפתרה (עם תשובה חיובית; די בארבעה צבעים) בשנות ה-70 של המאה ה-20, בסיוע מחשב (שבדק אלפי מקרים פרטיים שנדרשו להוכחה הכללית). בניסוחה המתמטי בעיית ארבעת הצבעים היא השאלה האם כל גרף מישורי הוא 4-צביע?

נתונים שלושה בתים ושלושה מקורות של מים, חשמל וגז. האם ניתן לחבר כל בית לכל שלושת המקורות מבלי ששני חיבורים ייחתכו? (הכל מצוייר על דף נייר והבתים המקורות הם נקודות).

התשובה לבעיה זו היא לא. בניסוחה המתמטי זוהי הטענה שהגרף הדו צדדי המלא $K_{3,3}$ איננו מישורי.

יש לבנות באופן אקראי ובזמן יעיל מבוך שבו בין כל שני תאים קיים מסלול אחד ויחיד.

בניסוח מתמטי מבקשים כאן לבנות עץ פורש של גרף מלא; קיימים אלגוריתמים יעילים לפתרון בעיה זו (ולפתרון בעיה כללית מעט יותר שבה יש "מחיר" לחיבור בין כל שני תאים ורוצים מבוך בעל מחיר מינימלי).

נתונים n גברים ו- n נשים כך שכל אישה מעוניינת בחלק מהגברים. האם ניתן לחלק את הגברים לנשים באופן מונוגמי כך שכל אישה מקבלים גבר שהיא מעוניינת בו?

משפט הזחזחנה של הול נותן תיאור מדויק וקל לבדיקה של תנאי שבו הדבר מתאפשר. בניסוח מתמטי זוהי השאלה באילו תנאים יש שידוך מושלם בגרף דו צדדי.

נעבור כעת לתיאור פורמלי ואבחנות בסיסיות.

הגדרה 10.1 (גרפים)

- גרף הוא זוג $G = (V, E)$ כאשר V היא קבוצה כלשהי ("קודקודים") ו- E היא אוסף זוגות של קודקודים ("קשתות").
- אם יש שתיים או יותר קשתות מצומת v אל צומת u הן נקראות קשתות מקבילות.
- אם יש קשת מ- v אל v היא נקראת חוג עצמי.
- גרף פשוט הוא גרף ללא קשתות מקבילות וחוגים עצמיים.
- גרף מכוון הוא גרף שבו קשת מ- v אל u נחשבת שונה מקשת מ- u אל v (במקרה זה יכולה להיות קשת בכל כיוון והן לא ייקראו קשתות מקבילות).
- דרגה של צומת $v \in V$, המסומנת $d(v)$, היא מספר הקשתות בגרף שמחוברות אל v .
- בגרף מכוון, דרגת הכניסה של צומת v , המסומנת $d_{in}(v)$, היא מספר הקשתות שנכנסות אל v ; דרגת היציאה $d_{out}(v)$ היא מספר הקשתות שיוצאות מ- v .
- צומת מבודדת היא צומת מדרגה 0.
- גרף $G = (V, E)$ הוא טופי אם הקבוצות V, E סופיות.

כבר כעת ניתן להוכיח משפט פשוט:

טענה 10.2 בגרף סופי $G = (V, E)$ מתקיים $\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$ - סכום דרגות הקודקודים הוא פעמיים מספר הקשתות.

הוכחה: נספור נקודות חיבור של קודקוד וקשת בשתי דרכים שונות. בדרך הראשונה, נעבור קשת קשת ולכל קשת נוסיף 2 לספירה כי היא מחוברת בדיוק לשני קודקודים - קיבלנו $2|E|$. בדרך השנייה נעבור קודקוד קודקוד ולכל קודקוד נוסיף לספירה את כל הקשתות שנוגעות בו - קיבלנו $\sum_{v \in V} d(v)$. ■

נחזור להגדרות:

הגדרה 10.3 (מסלולים, גרפים קשירים)

- מסלול בגרף הוא סדרה של צמתים v_1, v_2, \dots, v_n כך שבין כל שני צמתים סמוכים בסדרה יש קשת (ואם הגרף מכוון, הקשת היא מ- v_i אל v_{i+1}). מסלול יכול להיות גם אינסופי (ואז פשוט אין איבר אחרון לסדרה). מסלול מסומן לרוב בתור $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \dots \rightarrow v_n$.
- אורך של מסלול סופי הוא כמספר הקשתות שבהן עוברים במסלול (כל קשת נספרת כמספר הפעמים שעוברים בה), כלומר אורך המסלול $v_1 \rightarrow \dots \rightarrow v_n$ הוא $n - 1$.
- מעגל בגרף הוא מסלול שבו צומת ההתחלה זהה לצומת הסיום: $v_1 = v_n$ (כל צומת על המעגל יכול לשמש כצומת התחלה וסיום).
- מסלול או מעגל הם פשוטים אם הם אינם עוברים באותה צומת יותר מפעם אחת, למעט נקודות ההתחלה והסיום במקרה של מעגל. כמו כן מעגל פשוט נדרש להיות מאורך 3 לפחות.
- גרף הוא קשיר אם בין כל שני צמתים בגרף קיים מסלול.
- גרף מכוון הוא קשיר היטב אם קיים מסלול בגרף מכל צומת אל כל צומת אחר (זוהי ההגדרה האינטואיטיבית יותר במקרה של גרפים מכוונים).

משפט 10.4 (אפיון אלטרנטיבי לקשירות של גרף) גרף לא מכוון $G = (V, E)$ הוא קשיר אם ורק אם בכל חתך שלו - חלוקה של V לאיחוד זר של שתי קבוצות לא ריקות $V = X \cup Y$ - קיימת קשת מצומת כלשהי ב- X לצומת כלשהי ב- Y (עבור גרף מכוון, הגרף קשיר היטב אם ורק אם בכל חתך יש קשת מ- X אל Y ומ- Y אל X).

הוכחה: כיוון אחד: נניח כי G קשיר ויהא $V = X \cup Y$ חתך. X, Y לא ריקות אז יש $x \in X, y \in Y$. מכיוון שהגרף קשיר קיים מסלול $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \dots \rightarrow v_n$ כך ש- $v_1 = x, v_n = y$.

יהא i האינדקס המינימלי של צומת במסלול v_i כך ש- $v_i \in Y$. מכיוון ש- $v_n = y \in Y$ ו- $v_1 = x \notin Y$, הרי ש- $2 \leq i \leq n$. מהמינימליות של i עולה ש- $v_{i-1} \in X$ ולכן (v_{i-1}, v_i) היא קשת מ- X אל Y , כנדרש.

כיוון שני: נניח שהקריטריון מתקיים ונוכיח שהגרף קשיר. יהיו $x, y \in V$ כלשהם, ונגדיר קבוצה $U \subseteq V$ בתור קבוצת הצמתים שיש מסלול מ- x אליהם ב- G . בהכרח $x \in U$ כי קיים מסלול מ- x לעצמו באורך 0, ומכאן ש- U לא ריקה. אם $U = V$

אז סיימנו כי $y \in U$; אחרת $V = U \cup (V - U)$ הוא חתך של V ולכן קיימת קשת מ- U אל $u \in U$ אל $v \in V - U$. אבל יש מסלול מ- x אל u ולכן יש מסלול מ- x אל v $(x \rightarrow \dots \rightarrow u \rightarrow v)$, אבל אז $v \in U$ בסתירה לכך ש- $v \in V - U$. מכאן ש- $U = V$, כנדרש. ■

11 מסלולים אוילריאניים

נתונה מפת העיר קניגסברג של ימיו של אוילר. את העיר חוצה נהר במספר מקומות ועל הנהר יש גשרים. האתגר: למצוא טיול בעיר שעובר בכל גשר בדיוק פעם אחת. אפשר למדל את הבעיה באמצעות גרפים - קודקוד לכל איזור של העיר וקשת לכל גשר. מתקבל גרף לא מכוון עם קשתות מקבילות. השאלה: האם קיים בגרף מסלול שעובר בכל קשת בדיוק פעם אחת?

הגדרה 11.1 מסלול בגרף שעובר בכל קשת בדיוק פעם אחת נקרא מסלול אוילריאני. מסלול בגרף שעובר בכל צומת בדיוק פעם אחת נקרא מסלול המילטוני. בדומה, מעגל בגרף שעובר בכל קשת בדיוק פעם אחת נקרא מעגל אוילריאני ומעגל בגרף שעובר בכל צומת (פרט לצומת ההתחלה והסיום) בדיוק פעם אחת נקרא מעגל המילטוני.

הבעיה של בדיקה האם קיים מסלול אוילריאני בגרף היא פשוטה ונפתרה על ידי אוילר, כפתרון כללי לבעיית הגשרים של קניגסברג (על פתרון זה אומרים שהוא מציין את הולדת תורת הגרפים). לעומת זאת, הבעיה של בדיקה האם קיים מסלול המילטוני בגרף היא קשה ולא נעסוק בה בקורס זה; הזכרנו מסלולים המילטוניים לצרכי שלמות בלבד.

הגדרה 11.2 גרף G נקרא אוילרי אם קיים בו מסלול אוילריאני, ונקרא אוילרי מעגלי אם קיים בו מעגל אוילריאני.

משפט 11.3 (אוילר) יהא G גרף סופי וקשיר, אז:

1. G הוא אוילרי מעגלי אם ורק אם $d(v)$ זוגית לכל $v \in V$.

2. G הוא אוילרי אם ורק אם $d(v)$ אי זוגי בדיוק עבור שני צמתים $v \in V$.

הוכחה: ראשית נוכיח את 2 בהינתן ש-1 כבר הוכח. אם ב- G בדיוק שני צמתים מדרגה אי זוגית נוסף קשת שמחברת אותם (ייתכן שהיא תהיה מקבילה לקשתות שכבר מחברות אותם) וכעת דרגת כל הצמתים בגרף זוגית וקיים בו מעגל אוילריאני. ניקח את המעגל ונסיר ממנו את המעבר על פני הקשת שהוספנו (ובכך נכריח את הצמתים האי זוגיים להיות הראשון והאחרון במסלול המתקבל) וקיבלנו מסלול אוילרי ל- G . בכיוון השני, אם G הוא אוילרי אז ניקח מסלול אוילרי בו, נחבר את צומת ההתחלה והסיום בקשת ונקבל גרף עם מעגל אוילרי, ולכן דרגת כל הצמתים בו זוגית, ולכן לאחר הסרת הקשת שהוספנו נקבל שדרגת בדיוק שני צמתים היא אי זוגית - הצמתים שלהם הוספנו קשת.

נעבור כעת להוכחת 1. נניח ש- G הוא אוילרי מעגלי ויהא $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \dots$ מעגל אוילרי בו. נטייל על המעגל ובכל פעם שבה ניכנס לצומת או נצא ממנו נגדיל מונה עבור אותו צומת ב-1. נשים לב שבסיום הטיול על המעגל המונה של צומת יהיה

שווה בדיוק ל- $d(v)$ שכן אנחנו עוברים על כל הקשתות בגרף, ולכל קשת המחוברת ל- v אנו מגדילים את המונה שלו (אם כאשר אנחנו נכנסים אליו ואם כאשר אנחנו יוצאים).

כעת נשים לב שלכל צומת, מספר הפעמים שאנו נכנסים אליו שווה למספר הפעמים שאנו יוצאים ממנו (כי אחרי כל כניסה לצומת אנחנו גם יוצאים אליו למעט עבור v_1 שפעם אחת (בהתחלה) אנו יוצאים ממנו מבלי להיכנס, ובפעם השניה אנו נכנסים אליו מבלי לצאת, כך ששוב אנו מתאזנים. מכאן ש- $d(v)$ זוגי תמיד. הכיוון השני הוא עיקר ההוכחה. נניח ש- $d(v)$ זוגי לכל הצמתים בגרף הקשיר G ונוכיח כי קיים בו מעגל אוילרי.

נבחר צומת שרירותי $v \in V$ ונטייל בגרף החל ממנו באופן אקראי לחלוטין, כאשר אנו מוחקים כל קשת שאנו עוברים בה. מכיוון שדרגת כל צומת זוגית, מובטח לנו שבכל פעם שבה אנו נכנסים לצומת שאינה v אנו גם יכולים לצאת ממנה לאחר מכן ולכן איננו יכולים "להיתקע" אלא רק על ידי חזרה אל v . מכאן שהטיול שלנו בגרף ייצור בהכרח מעגל.

לאחר מחיקת כל קשתות המעגל מהגרף עדיין נשמר התנאי שכל הדרגות זוגיות. לכן ניתן לחזור שוב על התהליך (החל מצומת שדרגתה גדולה מ-0) ולקבל מעגל נוסף, וכן הלאה. בכל פעם מספר הקשתות שנותרו בגרף הופך לקטן יותר, ולכן התהליך יסתיים כעבור מספר סופי של צעדים ותתקבל סדרה C_1, C_2, \dots, C_k של מעגלים בגרף שכוללים את כל קשתות הגרף.

נשים לב שכל זוג מעגלים בעלי צומת משותפת ניתן לאחד באופן הבא: אם u היא הצומת המשותפת, אז נבנה משני המעגלים מעגל שצומת ההתחלה שלו היא u , לאחריה הולכים כמו על המעגל הראשון ומסיימים ב- u , ואז ממשיכים כמו המעגל השני ומסיימים ב- u (כמובן, המעגל אינו פשוט, אך זה לא נדרש).

כל עוד ניתן לאחד זוג מעגלים מתוך C_1, \dots, C_k , נעשה זאת. אם לבסוף מתקבל רק מעגל אחד, סיימנו; אחרת, תהא C קבוצת הצמתים של אחד המעגלים. מכיוון ש- G קשיר, קיימת קשת מצומת u ב- C אל צומת $v \in V - C$. מכיוון שכל קשת שייכת למעגל כלשהו, גם הקשת (u, v) שייכת למעגל שאיננו C (כי $v \notin C$) אבל מכאן עולה שהצומת u שייך למעגל הזה ולכן הוא משותף למעגל ול- C , בסתירה לכך שאין שני מעגלים בעלי צומת משותף. ■

קיים ניסוח של המשפט גם עבור גרפים מכוונים:

משפט 11.4 (אוילר, גרסה לגרפים מכוונים) יהא G גרף סופי, מכוון וקשיר.

1. G הוא אוילרי מעגלי אם ורק אם לכל צומת v מתקיים $d_{in}(v) = d_{out}(v)$.
2. G אוילרי אם ורק אם $d_{in}(v) = d_{out}(v)$ לכל זוג צמתים פרט לשני צמתים v, u אשר מקיימים:

$$d_{in}(v) = d_{out}(v) + 1 \quad (\text{א})$$

$$d_{out}(u) = d_{in}(u) + 1 \quad (\text{ב})$$

הוכחה: ההוכחה דומה להוכחה של משפט אוילר הרגיל; התנאים של הגרסה המכוונת של המשפט מאפשרים להפעיל את אותה ההוכחה ללא שינוי מהותי. ■

12 גרפי דה-ברויין

הגדרה 12.1 גרף דה-ברויין עם פרמטרים σ, n , המסומן $G_{\sigma, n}$, הוא גרף מכוון המוגדר באופן הבא:

- V מכילה σ^{n-1} צמתים שכל אחד מסומן על ידי מחרוזת מאורך $n-1$ מתוך הא"ב $\Sigma = \{0, 1, \dots, \sigma-1\}$.
- E מכילה σ^n קשתות שכל אחת מסומנת על ידי מחרוזת מאורך n מתוך Σ .
- הקשת $b_1 b_2 \dots b_n$ יוצאת מהצומת $b_1 b_2 \dots b_{n-1}$ ונכנסת לצומת $b_2 b_3 \dots b_n$.

טענה 12.2 לכל σ, n הגרף $G_{\sigma, n}$ הוא אוילרי מעגלי.

הוכחה: על פי משפט אוילר, די להראות שלכל צומת v $d_{in}(v) = d_{out}(v)$ ו- $G_{\sigma, n}$ קשיר.

למעשה, קשיר היטב. נראה מסלול מצומת $u = a_1 a_2 \dots a_{n-1}$ לצומת $v = b_1 b_2 \dots b_{n-1}$:

$$a_1 a_2 \dots a_{n-1} \rightarrow a_2 \dots a_{n-1} b_1 \rightarrow \dots \rightarrow b_1 b_2 \dots b_{n-1}$$

כלומר, בכל צעד מכניסים מצד ימין עוד תו במילה של v ומוציאים תו מהמילה של u . קל לראות שהקשתות המתאימות קיימות.

כדי לראות ש- $d_{in}(v) = d_{out}(v)$ נשים לב להתאמה חח"ע ועל בין קשתות נכנסות ויוצאות מ- v : אם $v = a_1 \dots a_{n-1}$ ו- $\sigma \in \Sigma$ כלשהו, אז נתאים בין הקשת הנכנסת $\sigma a_1 \dots a_{n-1}$ והקשת היוצאת $a_2 \dots a_{n-1} \sigma$. קל לראות כי זוהי אכן התאמה חח"ע ועל. ■

מעגל אוילרי בגרף $G_{2,3}$:

$$001 \rightarrow 011 \rightarrow 111 \rightarrow 110 \rightarrow 101 \rightarrow 010 \rightarrow 100 \rightarrow 000$$

ניתן להשתמש בכתיבה מקוצרת ולתאר את כל המסלול כסדרה באורך 8 (בכל פעם מתואר התו החדש שמתווסף למחרוזת: 00111010). את הדוגמה הזו ניתן להכליל בצורה המתבקשת:

הגדרה 12.3 סדרה $a_1 a_2 \dots a_{\sigma^n}$ נקראת סדרת (σ, n) דה-ברויין אם לכל $w \in \Sigma^n$ קיים i כך ש- $w = a_i a_{i+1} \dots a_{i+n-1}$ (האינדקסים הינם מודולו σ^n) בניסוח מילולי, סדרת דה-ברויין היא סדרה של אותיות מתוך Σ כך שכל מילה מאורך n מעל Σ מופיעה בה מתישהו באופן רציף (אם חושבים על המילה כציקלית, כלומר שסופה מחובר לתחילתה).

טענה 12.4 לכל σ, n יש סדרת (σ, n) דה-ברויין.

הוכחה: נתבונן בגרף דה-ברויין $G_{\sigma, n}$. כפי שראינו, קיים בו מעגל אוילרי. יהיו $e_1, e_2, \dots, e_{\sigma^n}$ הקשתות בגרף לפי הסדר שבו הן מופיעות במעגל. נבנה סדרת דה-ברויין באופן האינדוקטיבי הבא: היא מתחילה ב- e_1 , ולאחר מכן לכל e_i בתורו נוסיף לה את האות האחרונה ב- e_i עד ל- $\sigma^n - n$. מכיוון שאורך e_1 הוא n ואנחנו מוסיפים עוד $\sigma^n - n$ תווים, נקבל סדרה מאורך σ^n שמתארת במדויק את המעגל האוילרי, ומכיוון שכל מילה מופיעה בקשת במעגל, סיימנו. ■

13 עצים

13.1 הגדרה ואפיונים בסיסיים

הגדרה 13.1 עץ הוא גרף פשוט G המקיים את שתי התכונות הבאות:

- G קשיר.
- G חסר מעגלים.

משפט 13.2 התנאים הבאים שקולים³:

1. G הוא עץ.
2. G חסר מעגלים ותוספת כל קשת ל- G יוצרת מעגל (G הוא מקסימלי ביחס לתכונה "חסר מעגלים").
3. G קשיר ומחיקת כל קשת מ- G תהפוך אותו ללא קשיר (G הוא מינימלי ביחס לתכונה "קשיר").
4. לכל זוג צמתים u, v קיים מסלול פשוט יחיד מ- u אל v .

הוכחה: נוכיח באמצעות שרשרת גרירות.

$1 \Leftarrow 2$: אם G הוא עץ הוא חסר מעגלים על פי הגדרה. נניח כי מוסיפים ל- G את הקשת (u, v) ; מכיוון ש- G קשיר כבר קיים מסלול בין u אל v $u \rightarrow \dots \rightarrow v$ ומכיוון ש- (u, v) לא הייתה בגרף, המסלול לא עובר דרך (u, v) ולכן ניתן להוסיף אותה בסוף המסלול ולהשלים אותו למעגל $u \rightarrow \dots \rightarrow v \rightarrow u$.

$2 \Leftarrow 4$: ניקח שני צמתים $u, v \in V$, אם קיים ביניהם מסלול הוא יחיד, שכן שני מסלולים שונים ניתן לאחד לקבלת מעגל ונתון ש- G חסר מעגלים. לכן נותר להוכיח כי קיים ביניהם מסלול, אם קיימת ב- G הקשת (u, v) אז קיים ביניהם המסלול $u \rightarrow v$. אם הקשת (u, v) אינה בגרף, אז הוספתה ל- G תיצור מעגל; מכיוון ש- G הוא חסר מעגלים המעגל חייב לעבור דרך (u, v) ולכן הוא מהצורה $u \rightarrow v \rightarrow \dots \rightarrow u$ (בלי הגבלת הכלליות ניתן להניח שצומת ההתחלה והסיום הוא u) ומכאן שקיים ב- G כבר מסלול $v \rightarrow \dots \rightarrow u$.

$3 \Leftarrow 4$: קשיר כי בין כל זוג צמתים קיים מסלול. תהא (u, v) קשת בגרף; מכאן ש- $u \rightarrow v$ הוא המסלול היחיד בגרף מ- u אל v , ולכן אם תוסר הקשת (u, v) לא יהיה מסלול מ- u אל v והגרף יפסיק להיות קשיר.

$1 \Leftarrow 3$: קשיר על פי הנתון. נניח בשלילה שקיים בו מעגל פשוט $u \rightarrow v \rightarrow \dots \rightarrow u$ מכיוון שהמעגל פשוט $w \neq v$ (כי v אינו יכול להופיע פעמיים במעגל פשוט), אז לאחר הסרת הקשת (u, v) הגרף יוסיף להיות קשיר: כל מסלול בו שהשתמש בקשת (u, v) יכול ללכת במסלול $u \rightarrow w \rightarrow \dots \rightarrow v$ במקום. ■

הגדרה 13.3 יעד הוא גרף פשוט וחסר מעגלים (איחוד עצים זרים).

עלה בגרף כלשהו הוא צומת מדרגה 1.

³שימו לב לדמיון בין משפט זה למשפט מאלגברה לינארית לפיו ארבעת התנאים הבאים שקולים: קבוצת וקטורים היא בסיס, קבוצת וקטורים היא מקסימלית ביחס לאי-תלות לינארית, קבוצת וקטורים היא מינימלית ביחס לפרישה, וכל וקטור ניתן לכתובה כצירוף לינארי יחיד של אברי הקבוצה. הדמיון איננו מקרי - מרחבים וקטוריים וגרפים הם שתי הדוגמאות הקלאסיות למטרואידיים.

טענה 13.4 ביער סופי בן קשת אחת לפחות קיימים לפחות שני עלים.

הוכחה: ניקח בגרף מסלול פשוט באורך מקסימלי (קיים כזה שכן הגרף סופי ולכן אורך כל מסלול פשוט חסום על ידי מספר הצמתים בו). נקודות ההתחלה והסיום חייבות להיות עלים, שאם לא כן ניתן יהיה להאריך את המסלול; אם צומת ההתחלה אינה עלה, היא מחוברת לצומת נוסף שחייב לא להיות על המסלול (שאם לא כן יהיה בגרף מעגל, בסתירה לכך שהוא יער), ולכן ניתן להרחיב את המסלול על ידי הוספת מעבר לאותו הצומת. ■

טענה 13.5 אם $G = (V, E)$ הוא עץ בעל $n = |V|$ צמתים אז $|E| = n - 1$.

הוכחה: נוכיח באינדוקציה על n - מספר הצמתים. בסיס האינדוקציה הוא עבור $n = 1$: במקרה זה ב- G יש בדיוק $n - 1 = 0$ קשתות (כי קשת דורשת לפחות שני צמתים).

נניח את נכונות הטענה עבור n ונוכיח שבעץ בעל $n + 1$ צמתים יש בדיוק n קשתות. על פי טענה 13.4, ב- G קיים עלה. אם נסיר את העלה מהעץ, נקבל גרף בן n צמתים שגם הוא עץ (שכן הסרת עלה אינה פוגעת בקשירות העץ). לכן יש בו $n - 1$ קשתות על פי הנחת האינדוקציה; ומכאן שב- G יש n קשתות ($n - 1$ הקשתות של תת-העץ, ועוד הקשת שמחברת את תת-העץ אל העלה). ■

טענה 13.6 יהא $G = (V, E)$ גרף סופי בעל $n = |V|$ צמתים.

1. G הוא עץ אם ורק אם G חסר מעגלים בעל $n - 1$ קשתות.

2. G הוא עץ אם ורק אם G קשיר בעל $n - 1$ קשתות.

הוכחה: אם G הוא עץ אז לפי טענה 13.5 הוא בעל $n - 1$ קשתות וכמובן שהוא קשיר וחסר מעגלים, כך שנותר רק להוכיח את הכיוון השני בכל אחת משתי הטענות. נניח ש- G חסר מעגלים. כל עוד ניתן להוסיף ל- G קשתות מבלי ליצור מעגל, נעשה זאת עד לקבלת גרף G' שבו הוספת כל קשת תיצור מעגל. על פי טענה 13.2, G' הוא עץ; ולכן מטענה 13.5 יש בו $n - 1$ קשתות, כלומר $G = G'$, ולכן G הוא עץ. נניח ש- G קשיר. כל עוד ניתן להסיר מ- G קשת מבלי לפגום בקשירות שלו נעשה זאת עד לקבלת גרף G' שבו הורדת כל קשת תפגום בקשירות של הגרף. פי טענה 13.2, G' הוא עץ; ולכן מטענה 13.5 יש בו $n - 1$ קשתות, כלומר $G = G'$, ולכן G הוא עץ. ■

13.2 משפט קיילי לספירת עצים

נסמן ב- f_n את מספר העצים על קבוצת הצמתים $V = \{1, 2, \dots, n\}$ ("עצים מסומנים"; כאשר צמתי העץ לא ניתנים להבחנה אלו מאלו הבעיה קשה בהרבה).

$$\text{משפט 13.7 (קיילי)} \quad f_n = n^{n-2}.$$

נציג את ההוכחה של Prüfer. בהוכחה זו מראים התאמה חח"ע ועל בין קבוצת העצים על $V = \{1, 2, \dots, n\}$ וקבוצת המחרוזות מאורך $n - 2$ מעל הא"ב $\{1, 2, \dots, n\}$. ההתאמה תוצג באמצעות אלגוריתם המתרגם עץ למחרוזת, ואלגוריתם המתרגם מחר-וזת לעץ.

אלגוריתם **TreeToWord**: קלט: $G = (V, E)$ כך ש- G הוא עץ.

פלט: מילה $w = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_{n-2}$.
האלגוריתם:

1. עבור $i = 1, 2, \dots, n - 2$:

(א) תהא $(u, v) \in E$ הקשת כך ש- u הוא העלה המינימלי (מבחינת מספר הסידורי) בגרף G .

(ב) קבע $\sigma_i = v$ (האות ה- i היא מספרו הסידורי של השכן של העלה u ב- G).

(ג) הסר את u מהגרף G .

האבחנה הראשונה היא שהאלגוריתם עובד תמיד; לא מובן מאליו שבשלב א' יהיה תמיד ניתן למצוא עלה, אך זה נובע ישירות מטענה 13.4.

האבחנה השנייה היא שבסיום ריצת האלגוריתם, ב- G נותר צומת בודד ואף קשת (שכן מסירים מ- G בדיוק $n - 1$ צמתים). מכאן שלכל קשת ב- G , אחד משני צמתיה מוסר מהגרף בשלב כלשהו.

כעת עלינו להציג אלגוריתם ש"מפענח" מילה ובונה ממנה בחזרה את העץ המקורי. אם נוכל לבנות אלגוריתם כזה, הראינו התאמה הפיכה בין עצים ומחרוזות, כלומר התאמה חח"ע ועל. לשם כך עלינו להבין יותר טוב את הפלט של **TreeToWord**.

האבחנה לה אנו נזקקים היא שלכל $v \in V$, מופיע בפלט w בדיוק $d(v) - 1$ פעמים. זאת מכיוון ש- v מוסר מהגרף לכל היותר פעם אחת (כאשר הוא נותר בלי שכנים פרט לאחד), ולכן $d(v) - 1$ משכניו מוסרים לפניו ובכל הפעמים הללו v מתווסף למחרוזת (לאחר מכן או ש- v מוסר ולכן לא מתווסף למחרוזת אלא שכנו, או ש- v הוא הצומת היחיד שנותר).

מאבחנה זו עולה בפרט שאם v אינו מופיע ב- w , אז v הוא עלה בכל עץ שיוצר את w .

כעת נוכיח כי קיים בדיוק עץ אחד היוצר את w , באינדוקציה על n (מספר הצמתים-ים):

בסיס האינדוקציה עבור $n = 2$: במקרה זה w היא המחרוזת הריקה, ואכן קיים עץ יחיד בן שני הצמתים $\{1, 2\}$.

צעד: נניח באינדוקציה שלמה כי לכל $n' < n$, ההתאמה בין עצים ומילים היא אכן חח"ע ועל.

יהא $u \in \{1, 2, \dots, n\}$ המינימלי שאינו מופיע ב- w (קיים כזה שכן אורך w הוא $n - 2$). מכיוון ש- u אינו מופיע ב- w , הוא עלה בכל עץ שיוצר את w . לכן בהכרח w_1 הוא השכן של u בכל עץ שיוצר את w .

כעת "נקצוץ" את w_1 מ- w לקבלת $w' = w_2 \dots w_{n-2}$ ונסיר מ- V את u לקבלת $V' = V - \{u\}$.

מהנחת האינדוקציה נובע שקיים עץ יחיד $T' = (V', E')$ היוצר את המילה w' . מעץ זה מתקבל T על ידי הוספת הקשת (u, w_1) שראינו כי היא נקבעת באופן יחיד. מכאן ש- T נקבע באופן יחיד על ידי w , כנדרש.

הוכחה זו גם מתווה את האופן שבו יעבוד אלגוריתם פענוח שבונה עץ בהינתן מילה:

אלגוריתם **WordToTree**: קלט: מילה $w = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_{n-2}$

פלט: עץ $G = (V, E)$

האלגוריתם:

1. אתחל $S = V, E = \emptyset$.

2. עבור $i = 1, 2, \dots, n - 2$:

(א) מצא את u - הצומת המינימלי ב- S , שאינו מופיע ב- $w_i w_{i+1} \dots w_{n-2}$.

(ב) $E \leftarrow E \cup \{(u, w_i)\}$.

(ג) $S \leftarrow S - \{u\}$.

3. בשלב זה $S = \{u, v\}$. בצע $E \leftarrow E \cup \{(u, v)\}$.

13.3 עצים מכוונים

נפתח בהגדרות הדרושות כדי להכליל את מושג העץ לגרפים מכוונים:

הגדרה 13.8 שורש בגרף מכוון הוא צומת שקיים מסלול ממנו אל כל הצמתים. עץ מכוון הוא גרף מכוון אשר גרף התשתית שלו הוא עץ וקיים לו שורש.

כמקודם, ניתן לתת מספר אפיונים שקולים לכך שגרף הוא עץ מכוון:

משפט 13.9 יהא G גרף מכוון. הטענות הבאות שקולות:

1. G הוא עץ מכוון.
2. ל- G יש שורש ולכל צומת בגרף המסלול מהשורש אליו הוא יחיד.
3. ל- G יש שורש שדרגת הכניסה שלו 0 ולשאר הצמתים בגרף דרגת כניסה 1.
4. ל- G יש שורש ומחיקת כל קשת מ- G הופכת את G לחסר שורש.
5. גרף התשתית של G קשיר ול- G יש צומת אחד עם דרגת כניסה 0 ולשאר הצמתים דרגת כניסה 1.

הוכחה: נוכיח באמצעות שרשרת גרירות.

$1 \Leftarrow 2$: מכיוון ש- G הוא עץ מכוון קיים לו שורש v . נניח בשלילה כי קיים בגרף צומת u כך שיש שני מסלולים $v \xrightarrow{1} u, v \xrightarrow{2} u$, אז בגרף התשתית של G השרשור של שני המסלולים יוצר מעגל ולכן גרף התשתית אינו עץ, בסתירה לכך ש- G עץ מכוון.

$2 \Leftarrow 3$: אם דרגת הכניסה של השורש v אינה 0 זה אומר שיש צומת u כך שהקשת $u \rightarrow v$ בגרף; מכיוון שקיים מסלול מ- v אל u קיבלנו שיש שני מסלולים מ- v אל u בגרף - המסלול $v \rightsquigarrow u \rightarrow v$ והמסלול הריק מ- v לעצמו, בסתירה. באופן דומה, אם ל- u כלשהו יש דרגת כניסה לפחות 2, אז יש u_1, u_2 כך שהקשתות $u_1 \rightarrow u$ ו- $u_2 \rightarrow u$ בגרף, וקיבלנו שני מסלולים מ- v אל u : המסלול $v \rightsquigarrow u_1 \rightarrow u$ והמסלול $v \rightsquigarrow u_2 \rightarrow u$ (ואם יש לו דרגת כניסה 0 אז לא קיים מסלול אליו מהשורש).

$3 \Leftarrow 4$: קיום שורש v מובטח מתנאי 3. תהא $u \rightarrow w$ קשת כלשהי בגרף. בהכרח המסלול מ- v אל w הוא מהצורה $v \rightsquigarrow u \rightarrow w$ אחרת היינו מקבלים שני מסלולים שונים מ- v אל w , לכן אם נמחקת הקשת $u \rightarrow w$ מהגרף אין מסלול מ- v אל w ובכך v מפסיק להיות שורש. מכיוון שדרגת הכניסה של v הייתה אפס הוא היה בהכרח השורש היחיד בגרף, ולכן הגרף הפך לחסר שורש.

$4 \Leftarrow 5$: מכיוון שיש ל- G שורש v גרף התשתית בהכרח קשיר (מסלול בין כל שני צמתים נבנה משרשור שני המסלולים שמחברים אותם אל השורש). ל- v יש דרגת כניסה אפס כי אם יש קשת $u \rightarrow v$ אז אפשר להסיר אותה מהגרף ו- v עדיין יישאר

שורש. בדומה לכל צומת u אם יש שתי קשתות $u \rightarrow u_1 \rightarrow u$ ו- $u_2 \rightarrow u$ אפשר להסיר אחת מהן ועדיין יוותר מסלול מ- v אל u ומכאן ש- v יוותר שורש (ואם ל- u דרגת כניסה 0 אז לא קיים מסלול אליו מהשורש).

5 \Leftarrow 1: יהא v הצומת בעל דרגת הכניסה 0 בגרף. ראשית נוכיח כי v הוא שורש. יהא u צומת כלשהו בגרף, אז קיים מסלול $u = w_k \rightarrow \dots \rightarrow w_1 \rightarrow v$ בגרף התשתית של G ; נותר להראות שב- G כל הקשתות מכוונות בכיוון המסלול. אם אין קשתות במסלול, סיימנו; בנוסף, הקשת (u, w_1) חייבת להיות מכוונת לכיוון w_1 אחרת דרגת הכניסה של v גדולה מאפס, ומכאן נמשיך באינדוקציה: הקשת (w_{i-1}, w_i) היא מ- w_{i-1} אל w_i על פי הנחת האינדוקציה, ולכן כדי שדרגת הכניסה של w_i תהיה בדיוק 1 הכרחי שהקשת (w_i, w_{i+1}) תהיה מכוונת לכיוון w_{i+1} וכך עד $w_k = u$.
 נותר להראות כי גרף התשתית של G אינו כולל מעגלים. נניח בשלילה כי קיים מעגל; אז v אינו יכול להיות עליו (אחרת הייתה קשת נכנסת ל- v ודרגת הכניסה של v לא הייתה 0). נתבונן במסלול מ- v אל צומת u כלשהו על המעגל: $u = u_0 \rightarrow v = u_1 \rightarrow \dots \rightarrow u_k = u$, ויהא u_i בעל האינדקס i המינימלי שנמצא על המעגל ($i \geq 1$ שכן ראינו כי v אינו יכול להיות על המעגל). אז מצד אחד נכנסת אליו הקשת מ- u_{i-1} שאינו על המעגל, ומצד שני נכנסת אליו קשת מצומת שכן על המעגל, ולכן דרגת הכניסה שלו היא לפחות 2, בסתירה לנתון. ■

ישנו עוד אפיון אחד שהשמטנו מהרשימה שכן הוא תקף רק עבור גרפים מכוונים סופיים:

טענה 13.10 גרף מכוון G הוא עץ בעל שורש r אם ורק אם דרגת הכניסה של r היא 0, דרגת הכניסה של שאר הצמתים בגרף היא 1, וגרף התשתית של G חסר מעגלים.

הוכחה: כיוון אחד קל - אם G הוא עץ מכוון בעל שורש r אז גרף התשתית הוא עץ ולכן חסר מעגלים, וכבר ראינו כי היותו של G עץ גוררת את התכונה הנדרשת על הדרגות (אפיון 3 במשפט 13.9).

בכיוון השני עלינו להראות כי r הוא שורש (מה שגם יגרור את קשירות גרף התשתית-ית). יהא u צומת כלשהו בגרף. נבנה סדרה u_1, u_2, \dots באופן הבא: $u_1 = u$ ולכל i , u_{i+1} הוא הצומת שנכנס אל u_i . יש צומת כזה כל עוד $u_i \neq r$, כי דרגת הכניסה של u_i היא 1.

נניח כעת בשלילה כי קיימים $i < j$ כך ש- $u_i = u_j$. אז קיבלנו מעגל בגרף: $u_j \rightarrow \dots \rightarrow u_i = u_j$. מכאן שכל אברי הסדרה שונים אלו מאלו. מכיוון שניתן להמשיך את הסדרה כל עוד לא הגענו אל r ויש רק מספר סופי של צמתים בגרף שמספרם חוסם את אורך הסדרה, הסדרה חייבת להגיע אל r , מה שיראה קיום של מסלול מ- r אל u . ■

דוגמה נגדית פשוטה למשפט שלעיל במקרה שבו הגרף אינסופי היא גרף שמורכב מ"שרוך" אינסופי לשני הכיוונים $\dots \rightarrow \bullet \rightarrow \bullet \rightarrow \dots$, ועוד צומת מבודד (שישמש בתפקיד r).

13.4 עצים פורשים

13.4.1 הגדרה וקיום

13.11 הגדרה עבור גרף $G = (V, E)$ (שיכול להיות מכוון או לא מכוון):

- הגרף המושרה על G על ידי קבוצת צמתים $V' \subseteq V$ הוא הגרף $G' = (V', E')$ בו $E' = \{(u, v) \in E \mid u, v \in V'\}$.

• הגרף המושרה על G על ידי קבוצת קשתות $E' \subseteq E$ הוא $G' = (V', E')$ כאשר $V' = (v \in V | \exists u \in V : (u, v) \in E \vee (v, u) \in E)$. מכילה את כל הצמתים בהם נוגעות קשתות מ- E' .

הגדרות אלו שימושיות באופן כללי, אך אנו רוצים לדבר על סוג מיוחד של תת-גרף מושרה:

13.12 הגדרה. עץ פורש של גרף $G = (V, E)$ הוא עץ $T = (V, E')$ המושרה על ידי תת קבוצה $E' \subseteq E$.

ברור כי לכל גרף לא מכוון קשיר קיים עץ פורש (פשוט מסירים קשתות מהגרף עד שמגיעים למצב שבו הסרת כל קשת הופכת את הגרף לבלתי קשיר, ואז הוא עץ על פי משפט 13.2). פחות ברור המקרה של עץ מכוון:

13.13 טענה. לכל גרף מכוון עם שורש r יש עץ פורש עם שורש r .

הוכחה: לכל צומת $v \in V$ נגדיר את $dist(v)$ להיות אורך המסלול הקצר ביותר מ- r אל v (זה תמיד מספר טבעי כי r הוא שורש).

לכל $v \neq r$, נתבונן במסלול מאורך $dist(v)$ מ- r אליו: $r \rightarrow \dots \rightarrow u \rightarrow v$. נוסף לעץ שאנו בונים את הקשת $u \rightarrow v$.

ברור כי בבניה זו דרגת הכניסה של r תהיה 0 ודרגת הכניסה של כל צומת אחר תהיה 1 (כי מוסיפים לגרף בדיוק קשת אחת שנכנסת אליו). נותר להראות שהגרף המושרה שבנינו קשיר. נניח בשלילה שהוא אינו קשיר, ויהי v צומת מינימלי ביחס ל- $dist(v)$ שאינו ישיג מ- r . אז בגרף המקורי v נמצא על מסלול $r \rightarrow \dots \rightarrow u \rightarrow v$, ובלי הגבלת הכלליות ניתן להניח שזהו המסלול שבאמצעותו נבחרה הקשת שהוספנו לגרף עבור v . מכאן שהקשת $u \rightarrow v$ נמצאת בגרף המושרה שבנינו. כעת, $dist(u) < dist(v)$ (כי u נמצא לפני v במסלול הקצר ביותר שמוביל אל v) ומהמינימליות של v עולה ש- u ישיג מ- r בתת הגרף המושרה שבנינו, אבל מכך נובע שגם v ישיג. ■

13.4.2 ספירת עצים פורשים - משפט קירכהוף

בהינתן גרף מכוון G וצומת r , נשאלת השאלה כמה עצים פורשים יש ל- G עם שורש r . משפט קירכהוף מצביע על שיטה למציאת מספר זה באמצעות חישוב דטרמיננטה של מטריצה מיוחדת המותאמת לגרף.

13.14 הגדרה. בהינתן גרף מכוון G ללא חוגים עצמיים על צמתים $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ נגדיר את מטריצת הלפלטיאן L של הגרף באופן הבא:

L_{ii} שווה לדרגת הכניסה של v_i , $d_{in}(v_i)$
 L_{ij} עבור $i \neq j$ שווה למינוס מספר הקשתות ב- G מ- v_i אל v_j (אם מספר הקשתות הוא k_{ij} אז $L_{ij} = -k_{ij}$).

13.15 טענה. $\det(L) = 0$

הוכחה: לכל עמודה j , סכום האיברים בעמודה הוא 0. זאת מכיוון ש- L_{jj} שווה למספר הקשתות הנכנסות ל- j , ואילו לכל $i \neq j$ הוא מינוס מספר הקשתות הנכנסות אל j מ- i , ולכן $\sum_{i \neq j} L_{ij}$ הוא מינוס מספר הקשתות הכולל הנכנס ל- j . תוצאה מוכרת מאלגברה לינארית היא שמטריצה שבה סכום כל עמודה הוא 0 היא בעלת ערך עצמי 0, ולכן הדטרמיננטה שלה היא 0. ■

כדי לנסח את משפט קירכהוף אנו זקוקים להגדרה נוספת מאלגברה לינארית:

הגדרה 13.16 מטריצת המינור L_r של L היא המטריצה המתקבלת מ- L על ידי מחיקת השורה והעמודה ה- r .

וכעת ניתן לעבור לניסוח המשפט:

משפט 13.17 (קירכהוף) יהא G גרף מכוון עם מטריצת לפלסיאן L . מספר העצים הפורשים את G עם שורש v_r הוא בדיוק $\det(L_r)$.

לצורך הוכחת המשפט נתבסס על כך שאנו יכולים לכתוב את L_r כמכפלה של שתי מטריצות לא ריבועיות. ראשית, עבור $G = (V, E)$ נסמן ב- $|V| = n$ את מספר הצמתים וב- $|E| = m$ את מספר הקשתות.

כעת נגדיר מטריצות A, B מסדר $(n-1) \times m$ כך שכל שורה מתאימה שורה מתאימה לצומת של G פרט לצומת r , על פי הכללים הבאים:

$$A_{ik} = B_{ik} = -1 \quad \text{אם הקשת } e_k \text{ נכנסת לצומת } v_i \text{ ב-} G,$$

$$A_{ik} = B_{ik} = 1 \quad \text{אם הקשת } e_k \text{ יוצאת מהצומת } v_i \text{ ב-} G,$$

שאר הכניסות של שתי המטריצות הן 0.

כלומר, כל עמודה של A, B מייצג קשת בגרף, כך שבשורה שמתאימה לצומת שמ-מנה יוצאת הקשת יש 1 ב- A ו-0 ב- B , וכמו כן בשורה שמתאימה לצומת שאליה נכנסת הקשת יש -1 בשתי המטריצות. נשים לב כי השורה שמתאימה לצומת r של השורש לא מופיעה במטריצות.

$$L_r = AB^T \quad \text{טענה 13.18}$$

הוכחה: $L_{ii} = \sum_{k=1}^m A_{ik}B_{ki}^T = \sum_{k=1}^m A_{ki}B_{ki} = \sum_{j:e=v_j \rightarrow v_i} (-1) \cdot (-1) = d_{in}(v_i)$ כמו כן עבור $i \neq j$

$$L_{ij} = \sum_{k=1}^m A_{ik}B_{kj}^T = \sum_{k=1}^m A_{ik}B_{jk} = \sum_{e=v_i \rightarrow v_j} (-1)$$

הקשתות שנכנסות מ- i אל j .

כזכור, באלגברה לינארית מוכיחים את המשפט $\det(A \cdot B) = \det A \det B$. לרוע המזל, המשפט נכון רק עבור מטריצות ריבועיות, ואילו A, B שלנו אינן ריבועיות; למר-בה המזל קיימת הכללה של משפט זה.

משפט 13.19 (קושי-בינה): אם A, B מטריצות מסדרים $m \times n$ ו- $n \times m$ בהתאמה כך ש- $\det(AB) = \sum_{\sigma} \det A_{\sigma} \det B_{\sigma}$, אז מתקיים וגם $n \leq m$, $\{1, \dots, m\}$ ו- A_{σ} מייצג את תת-המטריצה מסדר $n \times n$ שמתקבלת מ- A על ידי מחיקת כל העמודות פרט לאלו שהאינדקסים שלהן ב- σ , ו- B_{σ} מוגדרת בדומה עבור מחיקת שורות.

המשפט מקל עלינו את הוכחת משפט קירכהוף בצורה משמעותית, שכן ל- A_{σ} ו- B_{σ} יש משמעות קומבינטורית פשוטה: הן מייצגות את מה שנותר מ- G לאחר שנבחרה בו תת-קבוצה σ של קשתות שהן מועמדות ליצור עץ. שימו לב ש- A, B הן מסדרים $(n-1) \times m, m \times (n-1)$ ולכן σ הוא בחירה של $n-1$ עמודות (קשתות) מתוך m העמודות (קשתות) האפשריות.

כדי להשלים את הוכחת המשפט יש להראות כי $\det L_r = \sum_{\sigma} \det A_{\sigma} \det B_{\sigma}^T = \sum_{\sigma} \det A_{\sigma} \det B_{\sigma}$ הוא בדיוק מספר העצים הפורשים של G שהשורש שלהם הוא v_r . לצורך כך נראה שני דברים:

1. אם σ מתאים לבחירה של $n - 1$ קשתות שיוצרות עץ פורש שהשורש שלו הוא v_r , אז $\det A_\sigma = \det B_\sigma = \pm 1$ (ולכן $\det A_\sigma \det B_\sigma^T = 1$).

2. אם σ מתאים לבחירה של $n - 1$ קשתות שאינן יוצרות עץ פורש, אז $\det A_\sigma = 0$ או $\det B_\sigma = 0$.

לבה הטכני של ההוכחה הוא בשתי התוצאות הבאות מאלגברה לינארית:

- החלפת שתי שורות או שתי עמודות של מטריצה הופכת את סימן הדטרמיננטה שלה אך לא משנה את ערכה המוחלט.

- הדטרמיננטה של מטריצה משולשית תחתונה היא מכפלת האיברים שעל האלכסון.

אם כן, נביא את A_σ, B_σ לצורה של מטריצה משולשית תחתונה על ידי סידור מחדש של השורות והעמודות.

אם σ מגדירה עץ פורש T ב- G , אז נבנה סדרה u_1, u_2, \dots של צמתים ו- e_1, e_2, \dots של קשתות באופן הבא: מכיוון ש- T הוא עץ, קיימים בו לפחות שני עלים, כלומר יש בו עלה שאינו v_r . עלה זה יהיה u_1 . הקשת שמחברת את u_1 לשאר הגרף תהיה e_1 . כעת נמחק את u_1 ו- e_1 מהעץ, ונקבל עץ חדש, שגם בו שני עלים שאחד מהם אינו v_r ומהם נבנה את u_2, e_2 וכן הלאה. הצומת האחרון שיוותר בגרף הוא v_r וממנו פשוט נתעלם. כעת נסדר מחדש את A_σ, B_σ כך שהשורה הראשונה היא של הצומת u_1 , העמודה הראשונה של e_1 , השורה השנייה של u_2 וכן הלאה.

נתבונן בשורה שמתאימה ל- u_i בכל אחת משתי המטריצות. אנו רוצים להראות שלכל $k > i$ מתקיים שהכניסה ה- ik שווה 0 כדי שהמטריצות יהיו משולשיות תחתונות. אם $u_{ik} \neq 0$ זה אומר שהקשת e_k מחוברת לצומת u_i (נכנסת או יוצאת ממנו) בעץ T , ושקשת זו הוסרה מהעץ רק אחרי הצעד שבו u_i הוסר מהעץ. אבל כאשר u_i מוסר מהעץ הוא עלה, ולכן e_i הייתה הקשת האחרונה שחיברה את u_i לעץ, ומכאן שלא ייתכן ש- e_k הייתה מחוברת אליו. כמו כן, e_i היא קשת שנכנסת ל- u_i , ולכן הכניסה ה- ii במטריצה היא -1 (גם ב- A וגם ב- B). מכאן שאכן נקבל $\det A_\sigma = \det B_\sigma = \pm 1$ במקרה זה.

נניח כעת כי σ אינה מגדירה עץ, ונראה כי $\det A_\sigma = 0$ או $\det B_\sigma = 0$, בהתאם לשני הדברים שיכולים להשתבש.

ראשית, ייתכן ש- σ אינה עץ אפילו בגרף התשתית של G . במקרה זה, מכיוון ש- σ היא קבוצה של $n - 1$ קשתות, בהכרח יש בגרף שמושרה מ- σ שני רכיבי קשירות, שכן כל גרף לא מכיוון קשיר עם $n - 1$ קשתות הוא עץ. נתבונן ברכיב הקשירות שבו v_r אינו נמצא, ובאוסף השורות ב- A_σ שמתאים לצמתים של רכיב קשירות זה. אם נראה כי סכום שורות אלו הוא 0, סיימנו; זה מוכיח כי השורות תלויות לינארית ולכן A_σ היא סינגולרית ו- $\det A_\sigma = 0$. הסכום הוא אפס שכן לכל עמודה במטריצה, אם הקשת שהיא מייצגת לא שייכת לרכיב הקשירות אז אף אחד משני הצמתים שמחברים אליה לא שייכים לקבוצת הצמתים של השורות שלקחנו, ואז העמודה תהיה שווה ל-0 בכל השורות בקבוצה שלנו; או שהקשת כן שייכת לרכיב הקשירות ואז שני הצמתים המחברים יהיו בקבוצת השורות שלנו, ומכיוון שבצומת שממנו יוצאת הקשת הערך הוא 1 ובצומת שאליה נכנסת הקשת הערך הוא -1 – שוב נקבל שהסכום הוא 0. נותר לטפל במקרה שבו σ מגדירה עץ בגרף התשתית אך בגרף המכוון זה איננו עץ ששורשו v_r . במקרה זה נראה כי $\det B_\sigma = 0$. נסדר את המטריצה כפי שעשינו במקרה שבו σ כן הגדירה עץ. מכיוון ש- σ לא מגדירה עץ במקרה זה, בהכרח זה מכיוון שיש קשת אחת לפחות שמכוונת בכיוון הלא נכון, כלומר יש i כך ש- e_i יוצאת מהצומת v_i , ולכן הכניסה ii במטריצה המסודרת מחדש תהיה 0, ומכאן שנקבל שהדטרמיננטה היא 0. זה מסיים את ההוכחה.

13.5 למת האינסוף של קניג

13.5.1 תיאור הלמה

נעבור כעת לדון בתכונה של גרפים מכוונים אינסופיים.

משפט 13.20 (למת האינסוף של קניג) יהא G גרף מכוון אינסופי עם שורש r כך שלכל צומת v , $d_{out}(v) < \infty$. אז קיים ב- G מסלול אינסופי שמתחיל ב- r .

לא קשה לראות את הכרחיות התנאי על סופיות הדרגות (למשל, גרף "קיפוד" שבו שורש אחד עם אינסוף שכנים ותו לא הוא דוגמה נגדית, כי כל המסלולים בו הם מאורך 1). הוכחה: על פי טענה 13.13 קיים ל- G עץ פורש עם שורש r . העץ אינסופי ודרגת היציאה של כל צומת בו היא סופית.

נבנה מסלול באופן האינדוקטיבי הבא: $v_0 = r$ ולכל i , אם v_i כבר נבנה אז v_{i+1} ייבחר להיות אחד מבניו של v_i שלו אינסוף צאצאים. התכונה שנשמרת באינדוקציה היא של- v_i יש אינסוף צאצאים, מה שמתקיים עבור r , ואם ל- v_i אינסוף צאצאים אז יש לו בן שגם לו אינסוף צאצאים כי מספר הצאצאים של v_i הוא סכום צאצאי בניו. מכיוון שה- v_i נבחרו בתוך העץ הפורש באופן שיוצר מסלול, לא ייתכן שנחזור פעמי-ים לאותו v_i שכן זה יסגור מעגל. מכאן שהמסלול אינסופי, כנדרש. ■

13.5.2 דוגמת שימוש - ריצופי Wang

אריח Wang הוא ריבוע שצלעותיו צבועות בצבעים כלשהם (לרוב כל צלע מסומנת במספר או אות במקום צבע כדי להקל על הסימון). ריצוף של המישור באמצעות אריחי Wang פירושו כיסוי כל המישור על ידי אריחים הצמודים זה לזה אך אינם עולים זה על זה, כך שכל זוג צלעות סמוכות של אריחים שונים הוא בעל אותו צבע. בעית ההכרעה הקלאסית של אריחי Wang היא זו: בהינתן קבוצה סופית של אריחים, כך שמכל אריח בקבוצה זמינים לנו אינסוף עותקים שלו, האם ניתן לרצף את המישור או לא באמצעות אריחים אלו? ניתן להוכיח כי בעיה זו אינה כריעה אלגוריתמית; לא קיים אלגוריתם הקובע לכל קבוצה האם היא מרצפת את המישור או לא. מצד שני, ישנו קריטריון שמאפשר להקל על ההוכחה שקיים ריצוף במקרים מסויימים:

משפט 13.21 (וואנג) בהינתן קבוצת אריחים A קיים ריצוף של המישור באמצעות A אם ורק אם לכל n טבעי קיים ריצוף של ריבוע $n \times n$ באמצעות A .

הוכחה: כיוון אחד קל: אם A מרצפת את המישור, אז לכל n נתבונן על ריבוע בגודל $n \times n$ כלשהו במישור; הוא עצמו יהיה מרוצף באופן חוקי ולכן קיבלנו ריצוף שלו באמצעות A .

בכיוון השני, נגדיר גרף באופן הבא: צמתי הגרף יהיו ריצופים חוקיים באמצעות A של ריבועים בגודל $n \times n$ לכל n טבעי אי זוגי $(1, 3, 5, \dots)$. על פי ההנחה, יש אינסוף ריצופים שכאלו (לפחות אחד לכל n) ולכן הגרף אינסופי.

נגדיר קשתות בגרף באופן הבא: יש קשת מהצומת u אל הצומת v אם ורק אם u הוא ריצוף של ריבוע בגודל $2n - 1$, v הוא ריצוף של ריבוע בגודל $2n + 1$ ו- u מתקבל מ- v על ידי "קילוף" הטבעת החיצונית ביותר.

כמו כן נוסיף לגרף צומת r ונוציא קשת ממנו לכל צומת u שמייצג ריצוף בגודל 1. בבירור r הוא שורש של הגרף שהתקבל: בהינתן u , "נקלף" אותו שכבה שכבה עד להגעה אל r .

בנוסף, דרגת היציאה של כל צומת בגרף היא סופית - לכל ריצוף יש רק מספר סופי של טבעות שבהן אפשר להקיף אותו.
מלמת האינסוף של קניג נובע כעת כי קיים בגרף מסלול אינסופי. הצמתים במסלול זה מייצגים ריצוף הולך ומתרחב של המישור (כל צומת "מסכים" עם הצמתים שקדמו לו על המשבצות שכבר רוצפו), וריצוף של המישור כולו מתקבל בתור הגבול של סדרה זו (לכל ריבוע במישור, האריח שיונח בריבוע זה מופיע בכל אברי הסדרה החל ממקום מסויים). ■

מסקנה 13.22 קיים ריצוף של המישור בעזרת A אם ורק אם קיים ריצוף של רבע המישור בעזרת A .

14 מספרי קטלן

נסיים את הקורס בתיאור של סדרת מספרים שמופיעה בבעיות ספירה טבעיות רבות, ובפרט אחת הקשורה לעצים.

1. כמה מסלולים יש ב- \mathbb{Z}^2 מ- $(0,0)$ אל (n,n) כאשר הצעדים המותרים הם ימינה ולמעלה והמסלול אף פעם לא מגיע אל מתחת לאלכסון הראשי $x=y$?

2. כמה סדרות סוגריים חוקיות קיימות עם n פותחים ו- n סוגרים? (סדרת סוגריים היא חוקית אם כשקוראים אותה משמאל לימין בשום שלב אין יותר סוגריים סוגרים מפותחים, ובסיום מספרם שווה).

3. כמה עצים בינאריים מלאים יש עם $n+1$ עלים? (בעץ בינארי מלא, לכל צומת שאינו עלה יש שני בנים בדיוק).

4. בכמה דרכים ניתן לחלק מצולע בן $n+2$ צלעות למשולשים?

הפתרון לכל ארבע הבעיות הללו הוא C_n - מספר קטלן ה- n .

14.1 מסלולי שריג

נפתח בפתרון 1 שיאפשר לנו למצוא נוסחה מפורשת ל- C_n . מספר מסלולי השריג הכוללים מ- $(0,0)$ אל (n,n) שכוללים צעדים ימינה ולמעלה ואין עליהם מגבלות אחרות הוא $\binom{2n}{n}$ - בוחרים את n הצעדים שבהם נעלה למעלה, ובשאר הצעדים הולכים ימינה.

מסלול "רע" הוא כזה שיורד מתחת לאלכסון $x=y$. נראה כי מספר המסלולים הרעים הוא כמספר המסלולים הכולל מ- $(1,-1)$ אל (n,n) , כלומר $\binom{2n}{n-1}$.

כל מסלול רע חייב לפגוש מתישהו את האלכסון המשני $y=x-1$ שכן בהתחלה המסלול מקיים $x=y$ ובכל צעד משנים את אחת הקואורדינטות ב-1.

נסמן ב- p את נקודת המפגש הראשונה של המסלול הרע עם $y=x-1$. כעת נשקף את המסלול בקטע שבין $(0,0)$ אל p ביחס לאלכסון $y=x-1$ (שיקוף שכזה פירושו שהמסלול מתחיל מ- $(1,-1)$, עולה בכל פעם שבה המסלול המקורי הולך ימינה, והולך ימינה בכל פעם שבה המסלול המקורי עולה). קל לראות פורמלית כי גם המסלול המשוקף מגיע אל p , ולכן אפשר לשרשר לו את המשך המסלול הרגיל.

קל לראות כי ההתאמה שתיארנו היא חד חד ערכית, שכן ניתן להפוך אותה על ידי ביצוע שיקוף חוזר. כמו כן נשים לב שההתאמה הפיכה לכל מסלול מ- $(1,-1)$ אל (n,n)

שכן מסלול שכזה חייב לגעת מתישהו ב- $y = x - 1$ (כי הוא מתחיל מתחת לאלכסון זה וצריך לסיים מעליו), ולכן קיבלנו התאמה חח"ע ועל כמבוקש. קיבלנו כי $C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1}$. כדי לפשט את הביטוי נשים לב לכך ש-

$$\begin{aligned} \binom{2n}{n-1} &= \frac{(2n)!}{(n-1)!(n+1)!} = \frac{(2n)!}{n!n!} \cdot \frac{n!}{(n-1)!} \cdot \frac{n!}{(n+1)!} \\ &= \binom{2n}{n} \cdot \frac{n}{n+1} \end{aligned}$$

ומכאן:

$$\begin{aligned} C_n &= \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} \\ &= \binom{2n}{n} \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) \\ &= \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \end{aligned}$$

זהו ביטוי מפורש למספר קטלן C_n .

14.2 סוגריים מאוזנים

ראשית נשים לב לשקילות הברורה שבין מסלולי שריג וסדרות סוגריים חוקיות (מציינ צעד עלייה למעלה, (מציינ צעד ימינה, והתנאי על האלכסון שקול לתנאי על סדרת סוגריים חוקית. כעת נשתמש בדרך ההצגה באמצעות סוגריים כדי לפתח ביטוי רקורסיבי למספר קטלן.

בסיס: $C_0 = 1$

צעד: $C_{n+1} = \sum_{i=0}^n C_i C_{n-i}$

הנוסחה נובעת מהאבחנה הבאה: לכל ביטוי סוגריים מאוזן לא ריק w קיימת הצגה יחידה מהצורה $w = (x)y$ כך ש- x, y הם ביטויי סוגריים מאוזנים, אולי ריקים. מכאן שמספר ה- w עם $n+1$ זוגות סוגריים הוא כמספרם של כל הזוגות x, y המתאימים שיש בהם בסה"כ n זוגות סוגריים.

14.3 עצים בינאריים

הגדרה 14.1 עץ בינארי הוא עץ מכוון שבו דרגת היציאה של כל צומת היא לכל היותר 2.

עץ בינארי מלא הוא עץ בינארי שבו דרגת היציאה של כל צומת היא 0 או 2.

כמה עצים בינאריים בעלי n צמתים (לא מסומנים) קיימים? כאן נוח להשתמש בתיאור רקורסיבי של עצים בינאריים:

טענה 14.2 (עצים בינאריים, הגדרה רקורסיבית)

• הגרף הריק הוא עץ בינארי.

- אם T_1, T_2 הם עצים בינאריים אז גרף מצומת r וקשתות אל T_1, T_2 הוא עץ בינארי ("קשת אל T " פירושה קשת אל השורש של T אם T לא ריק, ואחרת אין קשת)

נסמן ב- B_n את מספר העצים הבינאריים על n צמתים. מהתיאור הרקורסיבי שלעיל נובעת הנוסחה הרקורסיבית הבאה:

$$B_0 = 1$$

$B_{n+1} = \sum_{i=0}^n B_i B_{n-i}$ - סכימה על הבחירות האפשריות של עצים בתור בניס ל- r ; סכום הצמתים בשני העצים הוא n כי הצומת הנוסף משמש בתפקיד r .
נוסחה זו זהה לחלוטין לנוסחה של מספרי קטלן, דהיינו $B_n = C_n$.
נעבור כעת לטפל באופן דומה בעצים בינאריים מלאים. ההבדל העיקרי הוא שאנחנו סופרים את מספר העצים הבינאריים מלאים בעלי n עלים, ולא צמתים. מטעמי נוחות לא נחשיב את הגרף הריק כעץ בינארי מלא.

טענה 14.3 (עצים בינאריים מלאים, הגדרה רקורסיבית)

- גרף בעל צומת בודד הוא עץ בינארי מלא.
- אם T_1, T_2 הם עצים בינאריים מלאים אז גרף שמורכב מצומת r וקשתות אל T_1, T_2 הוא עץ בינארי מלא.

בעץ בעל צומת אחד יש גם עלה בודד. בעץ שנבנה מתוך T_1 ו- T_2 מספר העלים הוא סכום מספרי העלים של T_1, T_2 . זה מוביל לנוסחה הבאה:

$$D_1 = 1$$

$D_{n+1} = \sum_{i=1}^n D_i D_{n+1-i}$ - דומה לנוסחה הקודמת, אבל כעת עץ אינו יכול להכיל 0 עלים.

נבצע החלפת משתנה: $j = i - 1$, אז נקבל: $D_{n+1} = \sum_{j=0}^{n-1} D_{j+1} D_{n-j}$
מכאן שמתקיים $D_n = B_{n-1} = C_{n-1}$. כלומר, מספר העצים הבינאריים המלאים בעלי $n + 1$ עלים הוא בדיוק מספר קטלן ה- n .